

Cathéter de dialyse péritonéale: comment en prendre soin?



azdelta

Uw ziekenhuis.

Chère patiente, Cher patient,

En raison d'une forte diminution de la fonction rénale, un traitement de substitution à la fonction rénale doit être initié prochainement ou a déjà été initié entre-temps.

Si vous optez pour la dialyse péritonéale, il faut créer une voie d'accès dans l'organisme au moyen d'un cathéter de dialyse : un tube dans le ventre. Dans cette brochure, vous trouverez de plus amples informations sur les implications exactes.

Si vous avez besoin d'un complément d'information, n'hésitez pas à contacter le service de dialyse péritonéale. Vous trouverez les coordonnées au verso de cette brochure.

Le service de néphrologie

1 Description


Un cathéter de dialyse péritonéale est un tube souple, placé au plus profond de l'abdomen par intervention chirurgicale. L'intervention se déroule sous anesthésie générale et dure environ 30 minutes.

2 Soins de cathéter

Le pansement d'un cathéter doit être renouvelé trois fois par semaine. Vous pouvez le faire vous-même ou confier cette tâche à votre conjoint ou à votre infirmier/ère à domicile. On vous apprendra comment réaliser correctement les soins de pansement et les signes auxquels faire attention pour détecter précocement une infection.



Exemple de pansement de cathéter. (Vantive)



Exemple de ceinture pour ne pas exercer de pression sur le cathéter DP. (Vantive)

Attention :

- **NE JAMAIS** tirer sur le cathéter. Faites preuve de prudence lors de chaque manipulation.
- **NE JAMAIS** gratter le site d'insertion du cathéter (= porte cutanée).
- **TOUJOURS** ranger le cathéter en toute sécurité sous les vêtements.
- **TOUJOURS** réaliser le changement de dialyse péritonéale selon la méthode apprise.
- **TOUJOURS** réaliser le pansement selon la méthode apprise. Sous la douche, sécher soigneusement le site d'insertion et le cathéter avant de réaliser les soins de pansement.
- **TOUJOURS** vérifier la clarté du liquide écoulé de la dialyse péritonéale. Un aspect trouble peut indiquer une inflammation du péritoine (= péritonite). Dans ce cas, vous devez immédiatement avvertir votre infirmier/ère à l'hôpital.
- **TOUJOURS** avvertir votre infirmier/ère en cas de fièvre (plus de 38 °C), de démangeaisons, de douleurs, de faiblesse musculaire...
- **TOUJOURS** avvertir votre infirmier/ère en cas de rougeurs, de pus, d'enflément du site d'insertion du cathéter.

3

Douche

Avec un cathéter de dialyse péritonéale, il est déconseillé de nager ou de prendre un bain en raison du risque d'infection. La douche n'est autorisée qu'une fois le site de pose du cathéter totalement guéri et après accord du médecin. Il est important que les soins de cathéter soient réalisés immédiatement après la douche.

Contact

Dialyse péritonéale

Tél. 051 23 74 64

e PDverpleegkundigen@azdelta.be

Infirmière spécialisées en maladies rénales

Sabine Verniest

www.azdelta.be

Source : service de néphrologie

Médecins

Dr Gert De Schoenmakere

Dr Bart Maes

Dr Thomas Malfait

Dr Hans Schepkens

Dr An Vanacker

Dr Ignace Vandewiele