

# Abraxane-Tecentriq

Ce traitement associe une chimiothérapie (Abraxane) et une immunothérapie (Tecentriq).

La chimiothérapie est toxique pour les cellules et détruit les cellules cancéreuses. Elle peut également détruire certaines cellules saines et provoquer ainsi des effets secondaires (voir plus loin dans la brochure). L'immunothérapie agit différemment. Ce traitement active le système immunitaire de sorte que vos propres cellules immunitaires attaquent et détruisent les cellules cancéreuses. L'immunothérapie peut avoir des effets secondaires spécifiques (voir plus loin dans la brochure).

Ce traitement, qui consiste en une prise de sang, une consultation chez votre médecin traitant et l'administration des médicaments, dure environ une demi-journée. Il est conseillé de vous faire accompagner, surtout pour la première administration.

## Schéma général

Tecentriq est administré les jours 1 et 15.

Abraxane est administré les jours 1, 8 et 15.

Ce schéma se répète tous les 28 jours.

En cas d'apparition d'effets secondaires ou de taux sanguins défavorables, il est parfois possible de déroger légèrement à ce schéma.

## Tecentriq

Tecentriq (atézolizumab) est administré par perfusion toutes les deux semaines. L'administration de la première perfusion dure 60 minutes. Si vous la tolérez bien, l'administration des perfusions suivantes durera 30 minutes.

Le traitement est arrêté s'il apparaît que vous n'en retirez aucun bénéfice ou si les effets secondaires sont trop sévères. Tant que le médicament vous est utile, le traitement est poursuivi.

Dans de très rares cas, le traitement active le système immunitaire de telle manière qu'il attaque non seulement les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules saines, ce qui peut se traduire par des troubles en apparence anodins, tels que



démangeaisons, douleurs abdominales et diarrhée.

S'ils ne sont pas traités à temps, ces effets secondaires peuvent parfois s'intensifier brusquement. Il est donc très important que vous les signaliez à temps. Des symptômes peuvent apparaître à tout moment pendant le traitement et parfois même plusieurs mois après l'arrêt du traitement.

Des prises de sang seront réalisées régulièrement, notamment pour détecter certains de ces effets secondaires. Parfois, un effet secondaire peut nécessiter l'arrêt du traitement.

Si vous développez un ou plusieurs des troubles ci-dessous ou si un de ces troubles s'aggrave, consultez immédiatement votre médecin traitant. N'essayez pas de traiter vos troubles vous-même, à l'aide d'autres médicaments.

Les principaux effets secondaires d'origine immunologique sont les suivants :

- **Problèmes pulmonaires**, par exemple des difficultés respiratoires ou de la toux. Ces troubles peuvent indiquer une inflammation des poumons.
- **Diarrhée** (selles aqueuses, liquides ou molles) ou symptômes d'inflammation des intestins tels que douleurs abdominales et mucus ou sang dans les selles.
- **Inflammation du foie**. Les signes ou symptômes de l'hépatite sont, notamment, des anomalies des résultats des tests de la fonction hépatique (prise de sang), un jaunissement des yeux ou de la peau.
- **Inflammation ou problèmes rénaux**. Les symptômes sont, notamment, des anomalies des résultats des tests de la fonction rénale (prise de sang) ou une diminution de la production d'urine.
- **Problèmes touchant les glandes qui produisent des hormones** (notamment l'hypophyse, la thyroïde et les glandes surrénales). Les symptômes sont, par exemple, de la fatigue, une modification du poids ou des maux de tête et des troubles de la vision, une accélération du pouls, une perte ou une prise de poids, une transpiration abondante ou une sensation de froid, des vertiges.
- **Diabète**. Les symptômes sont une soif excessive, une augmentation de l'appétit associée à une perte de poids, de la fatigue, de la somnolence, une envie plus fréquente d'uriner.
- **Démangeaisons et éruption cutanée**

## Abraxane

Abraxane (nab-paclitaxel) est administré par perfusion les jours 1, 8 et 15, pendant 30 minutes.

Effets secondaires possibles :

- **Nausées et vomissements.** Vous pouvez prendre jusqu'à six comprimés de Litican par jour.
- **Diarrhée ou constipation.** En cas de constipation (selles dures et difficiles à évacuer), vous pouvez prendre du sirop Movicol jusqu'à trois fois par jour.
- **Neuropathie** : picotements au bout des doigts et sur la plante des pieds.
- **Accumulation de liquide**
- **Perte de cheveux** (50 à 90 %)
- **Éruption cutanée**
- **Douleurs musculaires et articulaires**
- **Diminution du nombre de globules blancs**, entraînant un risque accru d'infection. Si votre température dépasse 38 °C, vous devez vous rendre aux urgences. Consultez toujours votre médecin généraliste en cas de symptômes d'infection sans fièvre (nez qui coule, sensation de brûlure lorsque vous urinez, toux...).
- **Réaction d'hypersensibilité** lors de l'administration de la perfusion. Cette réaction peut se manifester sous forme de démangeaisons, d'une oppression thoracique, d'un essoufflement. Si vous ressentez ces troubles, avertissez immédiatement votre infirmier/ère traitant à l'hôpital de jour.

## Rinçage

Après l'administration de tous les médicaments, l'infirmier/ère installera une dernière poche à perfusion contenant du sérum physiologique, afin de vous administrer tous les médicaments restés dans la tubulure de perfusion. Vous aurez ainsi reçu la dose prescrite.

## Contact

Vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à nous contacter.  
Vous trouverez nos coordonnées au début de votre dossier.