

Adriamycine

Le traitement est administré une fois par semaine, pendant trois semaines consécutives. La quatrième semaine est toujours une semaine de repos, sans traitement.

Ce traitement, qui consiste en une prise de sang, une consultation chez votre médecin traitant et l'administration des médicaments, dure environ une demi-journée. Il est conseillé de vous faire accompagner par une connaissance, surtout pour la première administration.

Vous trouverez, ci-après, un aperçu chronologique des médicaments qui vous seront administrés, ainsi que leurs éventuels effets secondaires. Tous les médicaments sont préparés dans des poches à perfusion distinctes et administrés dans un de vos vaisseaux sanguins à l'aide d'une tubulure de perfusion.

Médicament contre les nausées

Avant le début de l'administration de la chimiothérapie à l'hôpital de jour, vous recevrez un comprimé d'Akynzeo et une gélule de dexaméthasone contre les nausées.

Akynzeo peut provoquer de la constipation, contre laquelle vous pouvez prendre du sirop ou des sachets de Movicol, si nécessaire.

Comme la dexaméthasone est de la cortisone, elle peut provoquer une rougeur du visage pendant quelques jours.

Chez vous, vous pouvez prendre jusqu'à six comprimés de Litican par jour tant que les nausées persistent.

Adriamycine

Ce produit de couleur rouge vous sera administré pendant 15 minutes environ.

Comme cette chimiothérapie est fortement irritante pour les veines, un port-à-cath, ou cathéter à chambre implantable, est toujours nécessaire.

Ce traitement est généralement bien toléré. Les effets secondaires suivants sont possibles :

- **Coloration rouge de l'urine**, due au colorant contenu dans le produit, peu après l'administration.
- **Perte de cheveux**. La plupart du temps, la chevelure se clairsème à mesure que le traitement avance. Un bonnet glacé peut être utilisé pour prévenir la perte de cheveux.
- **Modifications des ongles**. Les ongles peuvent devenir plus fragiles et se décolorer. Par mesure de prévention, vous pouvez vous limer les ongles court et appliquer une crème ou une huile hydratantes sur l'ongle et la cuticule. Évitez d'utiliser du vernis à ongles.
- **Sécheresse de la peau et des muqueuses**. En cas de sécheresse cutanée, il est préférable d'utiliser une lotion hydratante de qualité pour le corps ou une huile de bain. La sécheresse des muqueuses peut se manifester sous forme de picotements des yeux ou de croûtes (sanglantes) dans le nez. Pour les yeux, des larmes artificielles peuvent être utilisées. En cas de sécheresse de la muqueuse nasale, un peu de vaseline peut être appliquée dans la narine, à l'aide d'un coton-tige, ou une pommade nasale peut vous être prescrite. La chimiothérapie peut provoquer une sécheresse vaginale. Parlez toujours de ces troubles à votre médecin ou à votre infirmier/ère.
- **Diminution du nombre de globules blancs** : peut parfois se produire pendant le traitement. Le cas échéant, la chimiothérapie peut être reportée d'une semaine, jusqu'à ce que votre taux sanguin se rétablisse. Vous ne pouvez rien y faire vous-même. Nous vous conseillons toutefois d'être attentive à de possibles infections. Vérifiez donc régulièrement si vous avez de la fièvre. **Si votre température atteint 38 °C ou plus, informez-en immédiatement votre médecin ou rendez-vous aux urgences.**
- **Inflammation de la muqueuse buccale**. Cet effet secondaire peut parfois survenir pendant votre traitement. Une très bonne hygiène buccale est recommandée (se brosser les dents plusieurs fois par jour à l'aide d'une brosse à dents à poils souples). Il est également préférable d'éviter de consommer des aliments très irritants tels que des épices, de la moutarde, etc. Si vous développez malgré tout une inflammation de la muqueuse buccale, signalez-le à votre médecin. Il vous prescrira un bain de bouche.
- **Fatigue**

Contact

Vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à nous contacter.
Vous trouverez nos coordonnées au début de votre dossier.