

Afinitor

Comment Afinitor agit-il ?

Afinitor est un inhibiteur sélectif de la protéine m-TOR. Dans de nombreux cas de cancer, la protéine m-TOR est dérégulée, ce qui favorise la croissance des cellules cancéreuses.

Afinitor bloque l'action de cette protéine.

Comment devez-vous le prendre ?

- Afinitor se présente sous forme de comprimés de 5 et 10 mg. La dose est de 10 mg une fois par jour.
- Afinitor doit être pris une fois par jour, toujours à la même heure environ.
- Afinitor peut être pris pendant un repas ou en dehors.
- Le comprimé n'est pas sécable. Il doit être avalé entier, avec un verre d'eau. Il ne peut pas être mâché ni écrasé.
- Si vous avez oublié de prendre un comprimé, attendez simplement le lendemain pour prendre la dose suivante. Ne prenez JAMAIS de double dose.
- En cas d'effets secondaires, votre médecin peut arrêter temporairement le traitement, puis vous demander de le reprendre à une dose plus faible.
- Les comprimés ne peuvent PAS être retirés de l'emballage pour être conservés dans un pilulier. Les comprimés d'Afinitor doivent être conservés dans l'emballage, à l'abri de la lumière et de l'humidité, jusqu'à leur prise. Ils doivent être conservés à température ambiante et, surtout, hors de portée des enfants.

Effets secondaires

Consultez toujours immédiatement votre médecin traitant si vous développez un effet secondaire, afin d'éviter que ce dernier ne devienne trop sévère.

Effets secondaires possibles :

- **Diarrhée.** Pour y remédier, vous pouvez prendre de l'Imodium, jusqu'à six fois par jour. En cas de diarrhée

sévère ou persistant plus de 24 heures, il est préférable de vous rendre à l'hôpital ou de consulter votre médecin traitant.

- **Fatigue et manque d'énergie.**
- **Nausées et vomissements.**
- **Éruption cutanée, peau sèche, démangeaisons.** Si votre peau est sèche, utilisez une crème hydratante. En cas d'éruption cutanée ou de démangeaisons, il est préférable de consulter votre médecin traitant.
- **Inflammation de la muqueuse buccale :** sensation de brûlure, gencives sensibles, aphtes ou inflammations. Par mesure de prévention, utilisez une brosse à dents à poils souples et rincez-vous régulièrement la bouche à l'aide d'un bain de bouche désinfectant tel que Perio-Aid. En cas d'inflammation grave, consultez immédiatement votre médecin !
- **Diminution du nombre de globules blancs,** entraînant un risque accru d'infection. **En cas de fièvre ou d'infection, consultez toujours immédiatement votre médecin traitant.**
- **Sensibilité accrue aux infections bactériennes, virales ou fongiques.** En cas de symptômes d'infection (fièvre, toux, frissons, douleurs musculaires évoquant la grippe...), prévenez immédiatement votre médecin traitant et arrêtez de prendre Afinitor.
- **Essoufflement et toux irritative** dues à une inflammation des poumons (pneumopathie inflammatoire). En cas d'apparition de symptômes, consultez sans attendre votre médecin traitant et arrêtez immédiatement le traitement !
- **Diminution ou altération du goût.**
- **Augmentation de la glycémie et du taux de cholestérol.**
- **Les réactions d'hypersensibilité** avec essoufflement d'apparition soudaine, douleur thoracique, gonflement de la langue/gorge et du visage, etc. sont rares mais possibles. Dans un tel cas, prévenez immédiatement votre médecin traitant ou appelez le 100 en cas de symptômes graves.

Autres médicaments

Certains médicaments influencent l'action d'Afinitor, et inversement. De ce fait, l'action d'Afinitor peut être réduite ou d'autres effets secondaires peuvent parfois se produire.

- Informez toujours votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, y compris des médicaments à base de plantes et/ou des

médicaments homéopathiques.

- Évitez les médicaments contre les infections fongiques (fluconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole, kétoconazole).
- Évitez les médicaments à base de cortisone (dexaméthasone, prednisone, prednisolone).
- Évitez de prendre du millepertuis.
- Ne prenez pas d'antibiotiques macrolides ni d'inhibiteurs calciques tels que le vérapamil et le diltiazem.
- Ne buvez pas de jus de pamplemousse et ne mangez pas de pamplemousse.
- Ne prenez pas de nouveaux médicaments sans en parler à votre médecin.

Contact

Vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à nous contacter.
Vous trouverez nos coordonnées au début de votre dossier.