

Herceptin-Perjeta

Herceptin et Perjeta sont des traitements « ciblés », qui agissent sur la protéine Her2/Neu. Dans environ 20 % des cancers du sein, cette protéine Her2/Neu est présente en excès sur les cellules malignes. La protéine Her2/Neu est un type de facteur de croissance des cellules cancéreuses. Tant Herceptin que Perjeta inhibent ce facteur de croissance et entraînent ainsi la mort des cellules cancéreuses.

Herceptin

Le produit est administré toutes les trois semaines, au moyen d'une injection dans la fesse. L'injection est généralement bien tolérée.

Effets secondaires possibles :

- **Nausées et vomissements** : généralement très légers.
- **Diarrhée légère ou selles plus liquides**. Dans les cas graves, vous pouvez prendre de l'Imodium.
- **Diminution de la fonction cardiaque** : rare. Le fonctionnement de votre cœur sera contrôlé à intervalles réguliers pendant votre traitement.

Perjeta

Le produit est administré sous forme d'une perfusion d'une durée de 60 minutes environ. Lors de la deuxième administration, le produit peut être administré en 30 à 60 minutes.

Effets secondaires possibles :

- **Diminution de la fonction cardiaque** : voir Herceptin
- **Fatigue**
- **Maux de tête**
- **Éruption cutanée**
- **Perte de cheveux**
- **Nausées/vomissements et altération du goût**
- **Diarrhée** : pour y remédier, vous pouvez commencer par prendre jusqu'à quatre fois deux comprimés d'Imodium.



Néanmoins, si la diarrhée persiste plus de vingt-quatre heures ou s'accompagne de douleurs abdominales intenses et/ou de fièvre, vous devez vous rendre immédiatement à l'hôpital. Une diarrhée est généralement observée lors des premières administrations du traitement. Les troubles s'améliorent après quelques semaines.

- **Douleurs musculaires et articulaires**

Contact

Vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à nous contacter.
Vous trouverez nos coordonnées au début de votre dossier.