

Herceptin

Le traitement par Herceptin vous sera administré un jour précis de la semaine.

Herceptin est administré en hôpital de jour, au moyen d'une injection dans la fesse, toutes les trois semaines.

Herceptin n'est pas un agent chimiothérapeutique. Ce produit agit sur une protéine particulière, sur les cellules tumorales. Cette protéine est présente en excès sur les cellules malignes et les fait croître. Herceptin inhibe cette protéine et élimine le stimulus de croissance des cellules malignes.

Herceptin peut être administré seul ou en association avec une chimiothérapie.

Vous trouverez, ci-après, un aperçu chronologique des médicaments qui vous seront administrés, ainsi que leurs éventuels effets secondaires.

Herceptin

Injection brève, de 5 à 10 minutes, dans la fesse. La piqûre est généralement très bien tolérée.

Effets secondaires possibles :

- **Nausées et vomissements** : généralement très légers. Si nécessaire, vous pouvez prendre quatre à six comprimés de Litican par jour. Litican est un médicament contre les nausées.
- **Réaction d'hypersensibilité** : malaise généralisé, transpiration abondante, modifications de la tension artérielle (rare). Si vous ressentez une gêne pendant l'administration, prévenez immédiatement l'infirmier/ère qui effectue l'injection.
- **Diarrhée ou selles plus liquides**. Dans les cas graves, vous pouvez prendre de l'Imodium.
- **Diminution de la fonction cardiaque** : rare. Le fonctionnement de votre cœur sera contrôlé à intervalles réguliers pendant votre traitement, au moyen d'une échographie cardiaque.

Contact

Vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à nous contacter.
Vous trouverez nos coordonnées au début de votre dossier.

