

Kadcyla

Ce traitement vous sera administré un jour précis de la semaine.

Il sera répété toutes les trois semaines, chaque fois plus ou moins le même jour.

Ce traitement, qui consiste en une prise de sang, une consultation chez votre médecin traitant et l'administration du médicament, dure environ une demi-journée. Il est conseillé de vous faire accompagner, surtout pour la première administration.

Kadcyla est une combinaison d'Herceptin et d'un agent chimiothérapeutique appelé emtansine, dans une poche à perfusion. Herceptin n'est pas un agent chimiothérapeutique. Ce produit agit sur une protéine particulière, présente sur les cellules tumorales, appelée protéine Her2/Neu. Cette protéine est présente en excès sur les cellules malignes et les fait croître. Herceptin inhibe cette protéine et élimine le stimulus de croissance des cellules malignes.

L'emtansine est un agent chimiothérapeutique, c'est-à-dire un médicament qui détruit directement les cellules cancéreuses.

Vous trouverez, ci-après, un aperçu chronologique des médicaments qui vous seront administrés, ainsi que leurs éventuels effets secondaires.

Litican et Medrol

Litican est un médicament destiné à limiter autant que possible les nausées et/ou les vomissements éventuels. Le produit sera administré directement dans la tubulure de perfusion, à l'aide d'une petite injection.

Après l'administration du traitement, l'infirmier/ère vous remettra quelques comprimés de ce médicament, à emporter chez vous. Vous pouvez prendre les comprimés lorsque vous en avez besoin (jusqu'à six comprimés par jour), avec un peu d'eau, toujours une demi-heure avant le repas.

Avant le début de l'administration de Kadcyla, vous recevrez un comprimé de Medrol 32 mg, c'est-à-dire de la cortisone.



Medrol aide à lutter contre les nausées et est également utilisé en prévention d'une réaction allergique à Kadcylla.
Medrol peut provoquer une rougeur du visage pendant deux jours.

Kadcylla

Kadcylla combine Herceptin et l'agent chimiothérapeutique dans une poche à perfusion. La poche à perfusion possède un volume de 250 ml. La première fois, le traitement est administré en 90 minutes. Lors de tous les autres cycles, l'administration dure 30 minutes.

Effets secondaires possibles :

- **Nausées.** Généralement peu marquées. Pour y remédier, vous pouvez prendre jusqu'à six comprimés de Litican par jour.
- **Faible taux de globules blancs.** Vous ne pouvez rien y faire vous-même. Nous vous conseillons toutefois d'être attentive à de possibles infections. Vérifiez donc quotidiennement si vous avez de la fièvre. **Si votre température atteint 38 °C ou plus, vous devez en informer votre médecin et vous rendre aux urgences.** De même, si vous développez une infection sans fièvre (telle qu'un rhume, une cystite, etc.), informez-en toujours votre médecin généraliste ou votre médecin traitant au plus vite. Une dizaine de jours après l'administration de la chimiothérapie, vous devrez faire réaliser une prise de sang par votre médecin généraliste afin d'évaluer les répercussions du traitement sur vos cellules sanguines.
- **Faible taux de plaquettes.** En cas de tendance accrue aux saignements (saignement de nez difficile à arrêter, saignement des gencives...), consultez toujours votre médecin au plus vite afin de planifier une prise de sang.
- **Réaction d'hypersensibilité** pendant l'administration du produit. Elle se produit généralement lors de la première administration. Vous pouvez tout à coup ressentir une sensation d'oppression ou être un peu essoufflée. Votre tension artérielle peut diminuer et votre pouls peut s'accélérer. Vous pouvez également développer des frissons et de la fièvre. Si vous ressentez une gêne, prévenez immédiatement l'infirmier/ère de l'hôpital de jour. Il/elle réduira la vitesse de perfusion ou arrêtera celle-ci. L'infirmier/ère contrôlera également votre tension artérielle et votre pouls avant et après chaque administration du traitement.
- **Anomalies des valeurs de la fonction hépatique dans le sang.** Ces

valeurs seront systématiquement contrôlées lors de la prise de sang à l'hôpital de jour et chez votre médecin généraliste.

- **Diminution de la fonction cardiaque** : rare.
- **Éruption cutanée.**
- **Inflammation de la muqueuse buccale** : cinq à dix jours après l'administration du traitement. Une très bonne hygiène buccale est recommandée (se brosser les dents plusieurs fois par jour à l'aide d'une brosse à dents à poils souples). Il est également préférable d'éviter de consommer des aliments très irritants tels que des épices, de la moutarde, etc. Si vous développez malgré tout une inflammation de la muqueuse buccale, signalez-le à votre médecin. Il vous prescrira un bain de bouche.
- **Diarrhée.**
- **Fatigue.**

Contact

Vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas à nous contacter.
Vous trouverez nos coordonnées au début de votre dossier.