Lithotripteur
LEC

azdelta
Uw ziekenhuis.

Cher patient,

Nous avons pris contact avec vous pour programmer la fragmentation externe d'un calcul rénal ou présent dans une voie urinaire (lithotripsie extracorporelle ou LEC). Cette brochure informative est destinée à vous éclairer sur la façon de procéder.

L'équipe médicale du service d'urologie

Pour cette intervention, nous vous attendons le .....(jour) ...../...../.....à .....heures.

Présentez-vous au comptoir de réception de l'accueil pour y retirer les étiquettes à votre nom. Présentez-vous ensuite au secrétariat du service d'urologie, au rez-de-chaussée.

S'il vous est impossible d'être présent à ce rendez-vous, veuillez nous en avertir au plus tard la veille de l'intervention, au numéro 051 23 70 08.

1 De quoi s'agit-il ?

Le lithotripteur est un appareil capable de produire des ondes de choc qui permettent de fragmenter les calculs rénaux ou présents dans les voies urinaires en minuscules débris qui peuvent ensuite être éliminés spontanément et plus facilement par les urines. En fonction des résultats obtenus, une seule séance peut suffire, mais il est aussi possible qu'il faille procéder à plusieurs traitements. La séance dure environ 45 minutes.



2 Préparation

Antidouleurs

Pour que les ondes de choc soient mieux supportées et pour pouvoir appliquer une plus grande puissance de fragmentation, il est recommandé de prendre un traitement antalgique peu de temps auparavant (juste avant votre départ pour l'hôpital, par exemple).

Nous conseillons la prise d'un médicament du groupe AINS (anti-inflammatoire non stéroïdien), sauf en cas de contre-indications (maux d'estomac ou inflammation de l'intestin). On peut citer, à titre d'exemple :

- Feldene, Lyotab ou Voltaren en suppositoire ou en comprimé

- Autres marques d'AINS : Apranax, Brufen, Celebrex, Nurofen, Mobic, Diclofenac.

En cas de contre-indications pour les médicaments AINS ci-dessus, vous pouvez opter pour le paracétamol, idéalement à la codéine, p.ex. le Dafalgan Codéine.

ATTENTION ! En revanche, les médicaments contenant de l'aspirine (acide acétylsalicylique) **ne sont pas** autorisés parce qu'ils peuvent aussi exercer un effet hémodiluant. P. ex. Aspirine, Aspro, Dispril, Sedergine...

Interrompez la prise d'hémodiluants

ATTENTION ! Tous les hémodiluants doivent être arrêtés en temps opportun.

- Interruption 2 jours à l'avance : Eliquis, Xarelto, Pradaxa
- Interruption 1 semaine à l'avance : Aspirine, Asaflow, Plavix, Ticlid, Marcoumar, Marevan

Si nécessaire, vous pouvez vous concerter avec l'urologue ou votre généraliste pour envisager éventuellement l'utilisation temporaire d'injections de substitution.

Faut-il être à jeun ?

Sachez que vous ne devez pas être à jeun et que vous pouvez conduire votre voiture.

3 Soins post-intervention

Une fois le traitement administré, il est possible que vous constatiez pendant un certain temps la présence de débris dans vos urines. Il est parfois nécessaire de les recueillir dans un fin tamis pour les faire analyser.
Pour vérifier le résultat du traitement, nous vous convions à un examen de contrôle fixé sur rendez-vous; à cette occasion, il se

peut que nous prenions quelques clichés complémentaires.

Il est également possible que vous ressentiez une certaine gêne. Cette gêne peut se décrire comme une douleur diffuse. Par ailleurs, il se peut aussi que vous souffriez encore de quelques coliques néphrétiques. Si nécessaire, la prise d'un antidouleur peut s'avérer utile.

4 Risques et effets secondaires

Vos urines peuvent être temporairement colorées (sanguinolentes); normalement, ce phénomène disparaît rapidement en buvant beaucoup d'eau. Si toutefois la douleur s'intensifie lorsque vous buvez, il est préférable que vous arrêtiez de boire jusqu'à ce qu'elle disparaisse.

5 Prenez contact avec nos services dans les cas suivants :

- fièvre dépassant 38,5°C, combinée ou non avec des frissons et une sensation de froid
- douleur qui s'intensifie malgré la prise d'antidouleurs
- présence de sang dans l'urine, sous forme de caillots qui rendent la mixtion difficile

Dans ce cas, contactez votre médecin traitant ; les numéros d'appel se trouvent au verso de cette brochure.

6 Coût de l'intervention

Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le coût approximatif du traitement, veuillez contacter le service facturation au numéro 051 23 62 05 ou par e-mail à l'adresse factuur@azdelta.be

Notes

Contact

CAMPUS WILGENSTRAAT
t 051 23 70 08

CAMPUS DE MENIN
t 056 52 25 78

CAMPUS DE TORHOUT
t 050232436

AZ OUEST FURNES
t 058 33 31 11

www.azdelta.be

Source : informations du service d'urologie, 1 juillet 2019

Médecins

AZ DELTA
Dr Kristien Boel
Dr Lieven Goeman
Dr Heleen Maes
Dr Wouter Marchand
Dr Hans Van der Eecken
Dr Wim Van Haute
Dr Jean-Louis Vanhoucke
Dr Lieven Verhamme

AZ OUEST FURNES
Dr Marjan Lantsoght
Dr Jacques Pacco
Dr Hannes Van den Bossche

AZ Delta Deltalaan 1, 8800 Roeselare **t** 051 23 71 11 **e** info@azdelta.be **w** www.azdelta.be
0520 5225-FR **Cette brochure est revisée le 20/04/2020**