

Traitement d'hématologie : rituximab



azdelta

Uw ziekenhuis.

Chère patiente, cher patient,

Cette brochure contient des informations sur votre traitement par rituximab, la raison pour laquelle il vous est administré, son déroulement et ses effets secondaires possibles.

Si vous entrez en ligne de compte pour participer à une étude clinique, votre médecin traitant et le coordinateur de l'étude attaché au centre de l'essai clinique vous fourniront de plus amples informations à ce sujet.

Si vous vous posez encore des questions ou si certaines choses ne vous semblent pas claires après avoir lu cette brochure d'information, n'hésitez pas à vous adresser à votre médecin ou à votre infirmier/ère conseiller/ère en hématologie. Il est important que vous receviez une réponse claire à toutes vos questions et que vous soyez donc correctement informé(e). Il va de soi que le traitement ne débutera qu'après votre accord.

Les médecins et collaborateurs du service d'hématologie

1

Qu'est-ce que le rituximab ?

Le rituximab n'est pas une chimiothérapie mais une immunothérapie. Au cours de ce traitement, une certaine protéine se lie à la surface d'un type de globule blanc appelé lymphocyte B. Lorsque le rituximab se lie à la surface de ce lymphocyte B, il provoque la mort de la cellule.

Le rituximab peut également être administré en association avec une chimiothérapie ou en traitement d'entretien.

2

Administration du rituximab

Le rituximab est administré sous forme de perfusion (première administration), dont la vitesse est contrôlée par une pompe à perfusion, ou d'injections (administrations suivantes).

La première administration de rituximab est lente et dure environ 4 heures. La vitesse de départ est maintenue pendant la première heure, puis la vitesse de perfusion peut être augmentée toutes les demi-heures si vous tolérez bien le produit. Afin de s'en assurer, votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque seront contrôlées toutes les 15 minutes, à l'aide d'un tensiomètre automatique.

À partir de la deuxième administration, le rituximab peut être administré par injection ou par perfusion. La vitesse peut être augmentée plus rapidement que lors de la première administration. La durée totale de la perfusion est alors d'environ 3 heures.

3

Réactions allergiques

Pendant l'administration du rituximab et jusqu'à 2 heures après, vous pouvez développer des réactions d'hypersensibilité (= réactions à la perfusion). Ces réactions ressemblent fortement à une réaction allergique et peuvent prendre la forme suivante :

- fièvre
- frissons
- raideur musculaire
- éruption cutanée et éventuellement démangeaisons
- tension artérielle basse (hypotension)
- difficultés respiratoires

Afin de prévenir ces effets indésirables, vous recevrez les médicaments suivants une demi-heure avant l'administration du rituximab :

1. paracétamol ou Dafalgan Forte® 1 g : un antipyrétique
2. Levocetirizine® 5 mg : un antihistaminique qui supprime les réactions allergiques
3. éventuellement, corticostéroïdes tels que Medrol®

Si vous ressentez malgré tout des effets indésirables pendant l'administration du rituximab, la perfusion sera arrêtée. Votre médecin vous prescrira les médicaments nécessaires pour supprimer la réaction. Le médecin décidera ensuite quand la perfusion peut reprendre.

4

Effets secondaires du rituximab

Entre deux administrations de rituximab, vous pouvez développer des troubles généraux. Les plus fréquents sont notamment les suivants :

- fièvre
- fatigue
- nausées
- augmentation de la sensibilité aux infections due à une diminution des globules blancs, parfois des semaines, voire des mois, après la dernière administration de rituximab
- infections inhabituelles
- infections prolongées

Pour en savoir plus et obtenir des conseils utiles pour gérer au mieux ces effets secondaires, nous vous renvoyons au guide d'information.

5 Coût

Pour toute question concernant le coût du traitement, vous pouvez contacter le service financier en envoyant un message à factuur@azdelta.be 051 23 76 66.

Notes

A series of 20 horizontal dotted lines for taking notes.

20 horizontal dotted lines for writing.

Contact

CAMPUS RUMBEKE

Secrétariat d'hématologie

t 051 23 73 22

e secr.hematologie@azdelta.be

www.azdelta.be

Source : service d'hématologie

Médecins

Dr Dries Deeren

Dr Lien Deleu

Dr Caressa Meert

Dr Rutger Callens

Dr Jan Brijs