Traitement du staphylocoque doré avant une intervention chirurgicale

azdelta
Uw ziekenhuis.

Le Staphylococcus aureus

Le Staphylococcus aureus est une bactérie qui peut être présente dans le nez, la gorge ou sur la peau sans que l'on s'en aperçoive. Environ 30 % de la population est porteuse de cette bactérie. La bactérie ne provoque normalement pas de maladie ; cependant, une infection peut potentiellement se produire si la peau ou les muqueuses sont endommagées. Lors d'une intervention chirurgicale, la bactérie peut pénétrer dans l'organisme par une plaie, provoquant ainsi une infection de la plaie.

Élimination des bactéries

Vous allez bientôt subir une intervention pour laquelle il convient d'éliminer les bactéries (= « décolonisation »). Dans ce cadre, il faut utiliser un savon antiseptique et une pommade nasale antibiotique.

Calendrier de traitement

Le traitement consiste à appliquer une pommade nasale **(Bactroban®)** dans le nez **3 fois par jour pendant 5 jours consécutifs avant l'intervention**. Avec un écouvillon ou un coton-tige, prélevez une quantité de pommade de la taille d'une allumette et appliquez-la haut dans le bouchon nasal, à gauche et à droite. C'est, en effet, le site préféré des bactéries. Poussez ensuite doucement sur le nez en effectuant un mouvement de rotation pour étaler la pommade.

En même temps, lavez votre peau pendant **5 jours consécutifs avant l'intervention et le matin de l'intervention** complètement avec **du savon à la chlorhexidine (Hibiscrub®)**. Humidifier tout le corps. Lavez votre visage avec le savon non dilué, en particulier autour du nez. Évitez tout contact avec les yeux, les oreilles ou la bouche. Utilisez un gant de toilette neuf tous les jours.

Lavez-vous soigneusement les aisselles. Lavez également le reste de la poitrine, le dos, les épaules et les bras. Lavez soigneusement la zone de l'aine, le nombril et les fesses. Lavez vos jambes et vos pieds, en particulier entre les orteils. Rincez ensuite abondamment et séchez-vous avec une serviette propre.

Le jour 1 et le jour 5 de la préparation, lavez également vos cheveux avec ce produit.

Pendant la période de décontamination, les serviettes, les draps, le linge de lit, les sous-vêtements et les vêtements de nuit du patient doivent être changés au moins le premier, le deuxième et le cinquième cjour. Suivez le schéma comme indiqué.

	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5	Jour 6 (=day of surgery)
Datum	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__	__/__/__
Hibiwash®	X + cheveux	x	x	x	X + cheveux	x
Bactroban®	3x Le matin L'après-midi Le soir	3x Le matin L'après-midi Le soir	3x Le matin L'après-midi Le soir	3x Le matin L'après-midi Le soir	3x Le matin L'après-midi Le soir	/

Hygiène bucco-dentaire

Une bonne hygiène bucco-dentaire est également importante. Brossez-vous soigneusement les dents dans la période précédant l'intervention (deux fois par jour). Si vous portez une prothèse dentaire, en plus du brossage, il convient de la désinfecter par immersion dans un bain de bouche à l'Iso-bétadine (non dilué). Dans les 5 jours précédant l'intervention chirurgicale, faites tremper vos dents pendant 20 minutes une fois par jour et rincez-les4 ensuite.

Coût

Hibiscrub : 6,23 €
Bactroban : 9,6 €

Contact

Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours contacter le médecin traitant ou l'équipe d'hygiène de l'hôpital.
(tél. 051/23 75 10).

AZ Delta Deltalaan 1, 8800 Roeselare **t** 051 23 71 11 **e** info@azdelta.be **w** www.azdelta.be
0520 6543-FR **Cette brochure est revisée le 12/02/2026**