

24-uur-PH-meting bij reflux bij kinderen



azdelta

Uw ziekenhuis.

Beste ouder

Uw kind wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een pH-meting. Heel wat baby's en kinderen lijden aan reflux. Reflux is maaginhoud die terugvloeit naar de slokdarm. Dit wordt veroorzaakt door een onvoldoende werkende sluitspier aan de ingang van de maag. In deze brochure geven we u meer info hierover. Als u nog vragen hebt, aarzel niet om ze te stellen aan uw arts of aan de verpleegkundigen.

Het team kinderziekten

Wat is reflux?

Dit wordt veroorzaakt door een onvoldoende werkende sluitspier aan de ingang van de maag. Als er vaker dan gemiddeld zure maaginhoud naar de slokdarm terugvloeit, kan de slokdarm ontsteken.

Soms is reflux zichtbaar, bijvoorbeeld als er geregeld voedsel 'teruggegeven' wordt of als uw kind regelmatig braakt. In andere gevallen is reflux echter onzichtbaar en kunt u het alleen maar vermoeden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van reflux als uw kind ongewoon veel huilt of aanslepende problemen heeft met de luchtwegen zoals een langdurige hoest.

Bij een pH-meting gaat de arts na wanneer, hoeveel keer en hoelang er zure maaginhoud terugvloeit naar de slokdarm. Zo weten we hoe ernstig de terugvloeiing is en of deze abnormaal is.

Vorbereiding

Uw kind mag 2 uur voor het plaatsen van de sonde niets meer drinken of eten omdat het plaatsen van de sonde braakneigingen kan opwekken.

Voor het onderzoek zullen bepaalde geneesmiddelen stopgezet worden in overleg met uw arts.

Verloop van het onderzoek

We maken gebruik van een sonde waaraan een pH-meter bevestigd is. De sonde wordt langs de neus voorbij de keel in de slokdarm geschoven. Onder de neus en op de wang wordt de sonde met een pleister vastgemaakt.

Als de sonde geplaatst is, wordt het toestel in een rugzakje gestoken.

Daarna gaat uw kind naar de radiologie. Hier controleert men of de sonde zich precies op de juiste plaats bevindt.

Na de controle wordt de meting gestart. Tijdens de meting kan uw kind gewoon eten, spelen en slapen.

Het is heel belangrijk dat de sonde tijdens het onderzoek goed op zijn plaats blijft zitten. Let daarom goed op de handen van uw kind om te voorkomen dat hij of zij de sonde lostrekt. Bij kleine kinderen kan een kous over de handen soms helpen. Als de sonde per ongeluk zou loskomen, dan moet u onmiddellijk de verpleegkundige verwittigen.

Na het onderzoek

Na 24 uur wordt de sonde verwijderd. De kinderarts bekijkt de resultaten en bespreekt ze met u.

Kosten

Alle kosten voor uw verblijf en verzorging, komen op de ziekenhuisfactuur. Hebt u vragen over de ziekenhuisfactuur, neem dan gerust contact op met de medewerkers van de dienst facturatie op het nummer 051 23 39 89 of via factuur@azdelta.be.

Contact

Dienst kinderziekten

CAMPUS RUMBEKE

t kinderafdeling 051 23 62 31

t kinderdagziekenhuis 051 23 63 38

CAMPUS MENEN

t 056 52 21 76

CAMPUS TORHOUT

t 050 232341

www.azdelta.be

Bron: dienst kindergeneeskunde

KINDERARTSEN

CAMPUS RUMBEKE

Secretariaat

t 051 23 63 94

CAMPUS MENEN

Secretariaat

t 056 530533 (Dr. Ann Demeester , dr. Jijo John &

dr. Shady Al Hanini)

t 057 333603 (Dr. Peter Boucquey)

CAMPUS TORHOUT

Secretariaat

t 050 2 324 34