

Novolizer


Wat is een Novolizer?

De Novolizer is een droogpoederinhalator, waarmee de medicatie, die zich in poedervorm in het toestel bevindt, kan worden ingeademd. Het poeder is een mengsel van zeer kleine deeltjes geneesmiddel met grotere deeltjes lactose. Het is belangrijk dat de medicatie via de inhalator correct wordt ingenomen. De arts of kinderastmaverpleegkundige zal eerst testen of uw kindje krachtig genoeg kan inhaleren en de adem 5 seconden kan vasthouden zodat de werkzame stof voldoende in de luchtwegen terecht komt.

Nieuw toestel

Als dit een nieuw toestel is, dan moet u het voor gebruik eerst klaarmaken door het patroon in de Novolizer te plaatsen. Vraag bij voorkeur aan de apotheek om dit voor te tonen. Doe dit op de volgende manier.


1. Neem de Novolizer uit de plastic verpakking.
2. Hou het toestel horizontaal.
3. Bovenaan de Novolizer bevindt zich een klepje. Duw op de geribbelde delen, schuif het klepje naar voor en til het op.




4. Verwijder de beschermfolie van het potje met de vulling en neem de vulling uit het potje.



5. Plaats de vulling in de inhalator (met dosisteller naar het mondstuk gericht).



6. Plaats het klepje terug op de Novolizer en klikt het vast door het naar achter te schuiven.




7. De Novolizer is klaar voor gebruik.

Gebruik

1. Zit rechtop.

2. Neem de dop van het mondstuk door aan beide kanten op de geribbelde delen te duwen.



3. Hou de Novolizer horizontaal en druk de drukknop volledig in. U hoort een klik en de kleur van het controlevenster verandert van rood naar groen. De Novolizer is nu klaar voor gebruik.




4. Hou de Novolizer horizontaal.

5. Adem rustig en volledig uit. **Let op:** adem niet uit in de Novolizer!

6. Neem het mondstuk in uw mond (tussen de tanden) en omsluit het goed met de lippen.

7. Buig uw hoofd licht achterover.

8. Adem redelijk snel en diep in tot u een klik hoort die aangeeft dat de dosis vrijkomt. Daarna blijft u verder inademen. Bij correcte inhalatie verandert de kleur van het controlevenster van groen naar rood.



9. Hou de adem 5 tot 10 seconden in en neem ondertussen de inhalator uit de mond.

10. Adem rustig uit langs de mond.

11. Als u meerdere dosissen moet nemen, herhaal dan stap 3 tot stap 10.

12. Veeg het mondstuk af met een papieren zakdoek en plaats de dop terug op het mondstuk.

13. Spoel de mond met water.

Belangrijk

- Open het potje met de vulling pas net voor gebruik.
- Bewaar de Novolizer op een droge en koele plaats.
- Adem nooit uit in de Novolizer.
- De Novolizer is leeg als de dosisteller op nul staat.
- Als de dosisteller op nul staat, kan het toestel bijgevuld worden voor wat betreft Salbutamol en Budesonide.
- Let erop dat de tanden en de tong de opening van de inhalator niet blokkeren.
- Uw arts zal de dosis en de frequentie van de medicatie noteren in een schema. De onderhoudsmedicatie moet dagelijks 1 of 2 keer worden ingenomen; de aanvalsmedicatie enkel wanneer er onvoldoende controle is van de luchtwegproblemen. Wijzig de dosis en de frequentie van de onderhoudsmedicatie enkel na overleg.

www.azdelta.be

Bron: dienst kinderziekten, 28 januari 2019