Behandeling hematologie: Rituximab

azdelta
Uw ziekenhuis.

Beste patiënt

In deze brochure vindt u informatie over de behandeling met Rituximab:

- de reden van de behandeling
- het verloop van de therapie
- de mogelijke nevenwerkingen.

Als u in aanmerking komt om deel te nemen aan een klinische studie, zullen uw arts en de studiecoördinator van het Clinical Trial Center u hierover uitgebreid informeren.

De therapie start pas op na uw akkoord. Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of uw verpleegkundig consulent hematologie.

De artsen en medewerkers van de dienst hematologie

1 Wat is Rituximab?

Rituximab is geen chemotherapie maar een immunotherapie. Een soort eiwit dat zich bindt aan het oppervlak van de B-lymfocyt, een type witte bloedcel. Wanneer Rituximab zich aan het oppervlak van deze B-lymfocyt bindt, zorgt het ervoor dat de cel afsterft.

Rituximab kan ook gebruikt worden in combinatie met chemotherapie of als onderhoudsbehandeling.

2 Toediening van Rituximab

Rituximab wordt toegediend in de vorm van een infuus (eerste toediening) waarbij de snelheid wordt geregeld door een infuuspomp of inspuitingen (volgende toedieningen).

De eerste toediening van Rituximab verloopt traag en duurt ongeveer 4 uur. Het eerste uur blijft de startsnelheid behouden, daarna mag de infuussnelheid om het half uur verhoogd worden op voorwaarde dat u het product goed verdraagt. Om dit te kunnen opvolgen, controleren we uw bloeddruk en hartslag om de 15 minuten.

Vanaf de tweede toediening kan Rituximab worden toegediend via een inspuiting of verder via een infuus. Hierbij mag de snelheid vlotter opgedreven worden dan bij de eerste toediening. De totale duur van het infuus bedraagt dan ongeveer 3 uur.

3 Allergische reacties

Tijdens 1 tot 2 uur na het inlopen van Rituximab kunt u overgevoeligheidsreacties (= infuusreacties) krijgen.
Deze lijken sterk op een allergische reactie:

- koorts
- rillingen
- spierstijfheid
- huiduitslag met eventueel jeuk
- lage bloeddruk (hypotensie)
- ademhalingsmoeilijkheden

Om deze bijwerkingen te voorkomen krijgt u een half uur voor het toedienen van Rituximab medicatie:
1. paracetamol of dafalgan forte ® 1 g: een koortswerend middel.
2. levocetirizine® 5 mg: een antihistaminicum dat allergische reacties onderdrukt.
3. eventueel corticosteroïden zoals Medrol®

Wanneer u tijdens het inlopen van Rituximab toch nog last krijgt van bijwerkingen, wordt het infuus stopgezet. Uw arts schrijft dan de nodige medicatie voor om de reactie te onderdrukken en beslist wanneer het infuus opnieuw kan starten.

4 Nevenwerkingen van Rituximab

Tussen de toedieningen van Rituximab in kunt u last hebben van algemene klachten zoals:

- koorts
- vermoeidheid
- misselijkheid
- verhoogde vatbaarheid voor infecties door een daling van uw aantal witte bloedcellen, soms weken tot maanden na de laatste toediening van Rituximab
- ongewone infecties
- langer durende infecties
- een mogelijk hoger risico op een ernstige Covid-19-infectie

Voor meer uitleg en nuttige tips om deze nevenwerkingen zo goed als mogelijk op te vangen, verwijzen we graag naar de informatiegids.

5 Kostprijs

Voor vragen over de kostprijs kunt u contact opnemen met de financiële dienst via factuur@azdelta.be, tel. 051 23 76 66.

Notities

Contact

CAMPUS RUMBEKE
Secretariaat hematologie
t 051 23 73 22
e secr.hematologie@azdelta.be

www.azdelta.be

Bron: dienst hematologie

Artsen

Dr. Dries Deeren
Dr. Lien Deleu
Dr. Caressa Meert
Dr. Rutger Callens
Dr. Jan Brijs