Bescherm je baby tegen RSV

Praat erover met je arts!

Een besmetting met RSV (respiratoir syncytiaal virus) is de belangrijkste oorzaak van luchtweginfecties bij jongere kinderen. Tegen de leeftijd van twee jaar heeft bijna elk kind al eens RSV doorgemaakt. Het virus veroorzaakt meestal een een milde verkoudheid, maar kan ook soms leiden tot ernstigere aandoeningen zoals een ontsteking van de kleine luchtwegen (bronchiolitis) of een longontsteking. Vooral kinderen jonger dan 1 jaar, premature baby's en kinderen met een chronische ziekte (zoals een hartaandoening) lopen meer risico op een ernstige infectie. Een groot aantal van die baby's belandt hierdoor in het ziekenhuis.

Er is nog altijd geen genezende behandeling tegen RSV. Kinderen krijgen vooral ondersteuning om de klachten te verminderen, bijvoorbeeld met koortswerende medicatie, voldoende drinken, extra zuurstof of inhalaties als ze piepend ademen.

In 2022 keurde het Europese Geneesmiddelenagentschap een nieuw geneesmiddel (nirsevimab) goed om baby's tegen een ernstige RSV-infectie te beschermen. Sinds het najaar van 2024 is het geneesmiddel beschikbaar in België. Het gaat om antilichamen die het virus kunnen neutraliseren. Geen vaccin dus maar een behandeling die het lichaam tijdelijk beschermt.
Het middel werkt heel snel na de toediening en blijft een vijftal maanden lang aanwezig in het lichaam. Een prik aan het begin van het RSV-seizoen (van oktober tot maart) zorgt er zo voor dat baby's de hele winter beschermd zijn. Studies tonen aan dat de kans op een ziekenhuisopname bij RSV dankzij deze prik daalt met 80%.

- Kinderen die **vlak voor of tijdens het RSV-seizoen** geboren worden (tussen oktober en maart), kunnen kort na de geboorte op de kraamafdeling nirsevimab krijgen, zodat ze zo snel mogelijk beschermd worden.

- Kinderen die **buiten het RSV-seizoen** geboren worden (tussen april en september), en die voor de eerste keer een RSV-seizoen meemaken, kunnen vanaf september via hun

azdelta

Deze brochure is laatst aangepast op 14/08/2026 0520 6471-NL

kinderarts een afspraak maken om het geneesmiddel te krijgen. Vanaf het tweede RSV-seizoen wordt dit niet meer aangeraden.

De overheid heeft beslist om dit geneesmiddel voor een groot deel terug te betalen voor alle pasgeborenen (ook prematuur geboren kinderen).
De prik zelf kan geen RSV veroorzaken. Er zijn geen ernstige nevenwerkingen, enkel wat lokale zwelling, pijn of roodheid op de prikplaats.

Mama's kunnen er voor kiezen om tijdens de zwangerschap een vaccin toegediend te krijgen, waardoor ze antilichamen aan hun baby doorgeven. Zo is de baby de eerste zes maanden na de geboorte beschermd.

Meer info: zie www.victorvaccin.be

