Besnijdenis
(Totale circumcisie)

azdelta
Uw ziekenhuis.

Beste ouder

Bij uw zoon werd in overleg met uw arts beslist om een totale circumcisie of besnijdenis uit te voeren.
Deze folder geeft u informatie over de ingreep en de nazorg bij thuiskomst. Als u nog vragen hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen. U vindt de contactinfo achteraan deze brochure.

De dienst kinderziekten

Wat is een circumcisie?

Een circumcisie of besnijdenis is een chirurgische behandeling waarbij de volledige voorhuid van de penis wordt weggenomen. De overblijvende huid van de penis wordt gehecht op een randje net onder de eikel.
De hechtingen die worden gebruikt, zijn zelfverterend en moeten dus niet worden verwijderd. De ingreep gebeurt onder algemene verdoving en eventueel onder extra lokale verdoving zodat uw kind geen pijn voelt de eerste uren na het ontwaken.
De eerste dagen na de operatie kan de penis wat gezwollen zijn en kan er wat blauwe verkleuring optreden. Eventueel kan er nog beperkt bloedverlies zijn.

Wondzorg

1. Zolang zwelling van de penis aanwezig is na de operatie, wordt de penis best naar boven op de onderbuik gekleefd (met steriel kompresje ertussen) om ontzwelling te bevorderen. Na het urineren vernieuwt u het kompres.
   Als de uroloog bij uw zoon een circulair drukverband heeft aangebracht blijft dit aan gedurende de eerste 24 uur.
2. Gedurende een tweetal weken, 2 x per dag ontsmetten met chlorhexidini. Aansluitend wordt gedurende een 5 tal dagen Terra-cortriloogsuspensie aangebracht ter hoogte van de hechtingen.

Pijnstilling na de ingreep

Gedurende de eerste 48 uur na de operatie wordt bij pijn volgende medicatie best systematisch en op vaste tijdstippen toegediend: paracetamolpreparaat:
1 van volgende, maximum 4 x per dag:

- Dafalgan® siroop of zetpil
- of Perdolan® siroop of zetpil
- of Dafalgan® instant poeder

Indien nodig kunt u het paracetamolpreparaat maximaal 3x/d combineren met één van volgende pijnstillende/ ontstekingsremmende preparaten

- Nurofen® siroop, zetpil of pil
- of Malafene® siroop
- of Perdophen® siroop

Volg hierbij steeds de richtlijnen zoals aangegeven in de bijsluiter.

Aspirinebevattende medicatie zoals Aspegic®, Aspirine®, Sedergine®, Afebryl®, Perdolan® compositum is af te raden na de operatie.

Hygiënische zorg

Douchen is mogelijk. Na het douchen mag u de penis droogdeppen maar niet droogwrijven. Gedurende een tweetal weken mag uw kind geen zitbad nemen en niet zwemmen tot de hechtingen beginnen uit te vallen.

Voeding

De eerste dag na de operatie is lichte voeding aangeraden. Het is belangrijk om veel water te drinken.

School/kinderopvang

De dag na de operatie kan uw kind terug naar school of kinderopvang.

Complicaties

Neem contact op met de dienst urologie of uw huisarts indien er na de ingreep:

- koorts meer dan 38,5°C optreedt
- toenemende pijn of zwelling van de penis ontstaat
- een nabloeding optreedt.

Kostprijs

Alle kosten voor uw verblijf en verzorging, komen op de ziekenhuisfactuur. Hebt u vragen omtrent de ziekenhuisfactuur, neem dan gerust contact op met de medewerkers van de facturatiedienst op het nummer 051 23 76 66 of via factuur@azdelta.be.

Controle

Bij het vertrek uit het ziekenhuis krijgt u een controleafspraak mee van uw behandelende arts.
Bij problemen of vragen kunt u steeds uw huisarts of uroloog raadplegen.

Notities

Contact

Secretariaat **urologie -urodynamica-**
urologische oncologie-kinderurologie
CAMPUS RUMBEKE-MENEN
t 051 23 70 08
CAMPUS TORHOUT
t 050 23 24 36

Dagziekenhuis kinderziekten
CAMPUS RUMBEKE
t 051 23 63 38
CAMPUS MENEN
t 056 52 21 74
CAMPUS TORHOUT
t 056 23 23 41

www.azdelta.be
Bron: dienst kinderziekten, 24 april 2020

AZ Delta Deltalaan 1, 8800 Roeselare **t** 051 23 71 11 **e** info@azdelta.be **w** www.azdelta.be
0520 0032-NL **Deze brochure is laatst aangepast op 07/01/2021**