Blaasspoeling (BCG)

azdelta

Inhoud

1. Wat zijn blaaspoliepen? 3
2. Hoe vaak blaasspoelingen? 4
3. Wat te doen vóór blaasspoeling? 4
4. Verloop blaasspoeling 4
5. Wat te doen na blaasspoeling? 5
6. Aanbevelingen 5
7. Belangrijkste bijwerkingen 6
8. Tussenkomst vervoer 7
9. Kostprijs 7
10. Checklijst 8

© AZ Delta
Deze uitgave mag in zijn geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Beste patiënt

In deze brochure vind je informatie over blaasspoelingen met **BCG.** Uit onderzoek is namelijk gebleken dat je één of verschillende oppervlakkige blaaspoliepen hebt en daarom stelde de arts deze behandeling voor.

Lees deze brochure aandachtig en hou ze zorgvuldig bij zodat je, in geval van vragen, de brochure nog eens kan openslaan. Als je nog vragen hebt die in deze brochure niet aan bod komen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

De artsen en medewerkers van de dienst urologie

1 Wat zijn blaaspoliepen?

Blaaspoliepen zijn woekeringen van het slijmvlies van de blaas die het uitzicht hebben van een bloemkooltje. Poliepen zijn in de beginfase niet levensbedreigend, maar kunnen dit wel worden als ze verwaarloosd of niet behandeld worden. Blaasspoelingen worden voorgeschreven om de kans dat deze poliepen terugkomen, te verkleinen. Nabehandeling en controle na de operatie zijn hierbij aangewezen.

Er zijn verschillende producten die voor blaasspoelingen worden gebruikt. BCG® (Bacillus van Calmette-Guérin) is een tuberculosevaccin dat ook werkzaam is in de bestrijding van lokale blaaspoliepen. BCG veroorzaakt een plaatselijke ontstekingsreactie in de blaas die het natuurlijke immuunsysteem activeert en zo helpt om de poliepen te vernietigen.

2 Hoe vaak blaasspoelingen?

Blaasspoelingen zijn het meest doeltreffend wanneer ze volgens een welbepaald **schema** plaatsvinden. We starten met (6) wekelijkse spoelingen. We bespreken dit schema met jou voor de start. Tijdens de behandelperiode onderga je regelmatig een **controle** in de vorm van een cystoscopie (kijken in de blaas). Belangrijk te vermelden is dat wanneer een bepaald product niet helpt, er overgeschakeld kan worden naar een ander type product. Dit bespreken we dan met jou.

3 Wat te doen vóór blaasspoeling?

- **Geen tot beperkte vochtinname** tot 4 uur vóór de blaasinstillatie
- **Geen plaspillen nemen** zoals Lasix® of Burinex®. Zo voorkom je dat er te veel urine in de blaas komt. Te veel urine in de blaas kan BCG® te veel verdunnen waardoor de werking minder doeltreffend is. Je kan je plaspillen weer innemen na het uitplassen van de spoelvloeistof.

4 Verloop blaasspoeling

Vóór elke toediening van BCG® vraagt de verpleegkundige of je **bijwerkingen** hebt opgemerkt tijdens of na de vorige blaasspoeling. Hiervoor breng je het document mee waar de eventuele bijwerkingen werden aangeduid. Zie checklijst onderaan deze brochure.

Voor we starten vragen wij jou om te **plassen**, zodat de blaas zo leeg mogelijk is. Daarna verwijder je je onderkleding en neem je plaats op de behandeltafel. De verpleegkundige plaatst een **katheter** (een flexibel, hol buisje) door de plasbuis tot in de blaas. Dit is niet pijnlijk maar sommige mensen voelen dit aan als onaangenaam. De katheterisatie is nodig om de blaas volledig te ledigen. Via diezelfde katheter dienen we daarna BCG® toe in de blaas. Vervolgens verwijderen we de katheter.

5 Wat te doen na blaasspoeling?

- **Geen tot beperkte vochtinname tot 2 uur** na de blaasinstillatie. Als je thuis plaspillen neemt, mag je deze 2 uur na de blaasspoeling innemen.
- **2 uur urine ophouden en in beweging blijven.** Beweging zorgt ervoor dat de vloeistof zich goed verspreidt doorheen de blaas. Als je last hebt van urineverlies of minder mobiel bent, kan er eventueel een verblijfskatheter worden geplaatst en blijf je gedurende een uur in het ziekenhuis.
- **Na het ophouden** van het product is het noodzakelijk om **veel te drinken** (+/- 1,5 liter), zodat eventuele irritatie van de blaas zoveel mogelijk wordt vermeden.

Na het toedienen van BCG® is de urine troebel. Daar hoef je je geen zorgen over te maken.

6 Aanbevelingen

Bij BCG® volg je best de volgende aanbevelingen.

- Urineer zittend (ook mannen);
- Spoel het toilet tweemaal door met het deksel dicht tot 48 uur na de behandeling;
- Gebruik zoveel mogelijk hetzelfde toilet;
- Was na elke plasbeurt je handen en geslachtsdelen met water en zeep. Doe dit telkens tot acht uur na het uitplassen van het product;
- Voeg tot 6 uur na de blaasspoeling, voor het doorspoelen van het toilet, een chloortablet aan de urine toe;
- Reinig het toilet minimaal één keer per dag met chloor;
- Geen geslachtsgemeenschap gedurende 1 week.

7 Belangrijkste bijwerkingen

Bijwerkingen van BCG zijn er persoonsgebonden. Sommige patiënten hebben geen last van bijwerkingen en anderen wel.

- Koorts meer dan 38,5°C;
- Zeurend gevoel in de onderbuik en frequente aandrang;
- Allergische reactie (bv. jeuk aan de handen of voetzolen);
- Huiduitslag;
- Bloed in de urine;
- Algemene malaise, griepachtige verschijnselen. Bij deze klachten mag je gerust paracetamol (bv. Dafalgan®) gebruiken. De klachten zijn normaal, maar mogen niet langer dan twee dagen aanhouden. Als dit wel het geval is, verwittig dan je huisarts of de behandelende uroloog.

Wanneer je plotseling **helemaal niet meer kan plassen**, is de oorzaak niet noodzakelijk de behandeling met BCG. Neem in dat geval meteen contact op met de raadpleging urologie of je huisarts en vermeld ook dat je een behandeling hebt gekregen met BCG.

Ook in geval van hoge koorts (meer dan 39°C), rillingen, lage bloeddruk, snelle pols, verwardheid, blijvende gewrichtspijn, kortademigheid, jeuk over het hele lichaam en netelroos (erg jeukende uitslag van de huid waarbij eerst rode vlekken en nadien dikke bleke plekken verschijnen) is het nodig contact op te nemen met je arts.

Buiten de kantooruren of in het weekend neem je contact op met je huisarts (van wacht) of met de dienst spoedgevallen. Vermeld ook daar dat je een behandeling hebt gekregen met BCG.

8 Tussenkomst vervoer

Er is een financiële vergoeding door het ziekenfonds voor het vervoer heen en terug naar het ziekenhuis. Er wordt op het einde van de behandeling een medisch attest opgestuurd dat je kan binnenbrengen bij je ziekenfonds. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de sociale dienst in het ziekenhuis.

9 Kostprijs

Als je wenst te weten hoeveel de behandeling je ongeveer zal kosten kan je contact opnemen met de dienst facturatie op het nummer 051 23 62 05 of mailen naar factuur@azdelta.be.

10 Checklijst

Als je wordt geconfronteerd met één van de volgende bijwerkingen, duid dit dan aan op de lijst en breng deze mee bij je volgende afspraak.

Had je na de blaasspoeling volgende klachten?	**Ja of neen**
Koorts (boven 38.5°C), indien ja hoeveel dagen?	
Bloed bij het plassen, indien ja hoeveel dagen?	
Pijn bij het urineren	
Meer dan gewoonlijk moeten plassen	
Huiduitslag: handen/voeten/ geslachtsdelen/buik/rug/ benen	
Moeheid	
Jeuk (plaats aanduiden)	
Gewrichtspijn	
Kortademigheid	
Grieperig gevoel	
Andere:	

Notities

Contact

Secretariaat dienst urologie
CAMPUS WILGENSTRAAT
t 051 23 70 08

CAMPUS MENEN
t 056 52 25 78

CAMPUS TORHOUT
t 050 23 24 36

www.azdelta.be

Bron: info dienst urologie

Artsen

Dr Kristien Boel
Dr Matthias Boeykens
Dr Jasper Decoene
Dr Karel Dewulf
Dr Lieven Goeman
Prof Dr Steven Joniau
Dr Heleen Maes
Dr Eduard Roussel
Dr Wim Van Haute
Dr Lieven Verhamme

AZ Delta Deltalaan 1, 8800 Roeselare **t** 051 23 71 11 **e** info@azdelta.be **w** www.azdelta.be
0520 5033-NL **Deze brochure is laatst aangepast op 16/07/2026**