

Blaasspoeling (BCG)



azdelta

Uw ziekenhuis.

Inhoud

1. Wat zijn blaaspoliepen?	3
2. Hoe vaak blaasspoelingen?	3
3. Wat te doen vóór blaasspoeling?	4
4. Verloop blaasspoeling	4
5. Wat te doen na blaasspoeling?	4
6. Aanbevelingen	5
7. Belangrijkste bijwerkingen	5
8. Tussenkost vervoer	6
9. Kostprijs	6
10. Checklijst	7

Beste patiënt

In deze brochure vindt u informatie over blaasspoelingen met **BCG**. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat u één of verschillende oppervlakkige blaaspoliepen heeft en daarom stelde de arts deze behandeling voor.

Lees deze brochure aandachtig en hou ze zorgvuldig bij zodat u, in geval van vragen, nog eens de brochure kan openslaan. Als u nog vragen hebt die in deze brochure niet aan bod komen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

De artsen en medewerkers van de dienst urologie

1

Wat zijn blaaspoliepen?

Blaaspoliepen zijn woekeringen van het slijmvlies van de blaas die het uitzicht hebben van een bloemkooltje. Poliepen zijn in de beginfase niet levensbedreigend, maar kunnen dit wel worden als ze verwaarloosd of niet behandeld worden. Blaasspoelingen worden voorgeschreven om de kans dat deze poliepen terugkomen, te verkleinen. Nabehandeling en controle na de operatie zijn hierbij aangewezen.

Er zijn verschillende producten die voor blaasspoelingen worden gebruikt. BCG® (Bacillus van Calmette-Guérin) is een tuberculosevaccin dat ook werkzaam is in de bestrijding van lokale blaaspoliepen. BCG veroorzaakt een plaatselijke ontstekingsreactie in de blaas die het natuurlijke immuunsysteem activeert en zo helpt om de poliepen te vernietigen.

2

Hoe vaak blaasspoelingen?

Blaasspoelingen zijn het meest doeltreffend wanneer ze volgens een welbepaald schema plaatsvinden. We starten met (6) wekelijkse spoelingen. We bespreken dit schema met u voor de start. Tijdens de behandelperiode ondergaat u regelmatig een controle in de vorm van een cystoscopie (kijken in de

blaas). Belangrijk te vermelden is dat wanneer een bepaald product niet helpt, er overgeschakeld kan worden naar een ander type product. Dit wordt dan met u besproken.

3 **Wat te doen vóór blaasspoeling?**

Geen tot beperkte vochtinname tot 4 uur vóór de blaasinstillatie

Geen plaspillen nemen zoals bv. Lasix® of Burinex®. Zo voorkomt u dat er te veel urine in de blaas komt. Te veel urine in de blaas kan BCG® te veel verdunnen waardoor de werking minder doeltreffend is. U kan uw plaspillen weer innemen na het uitplassen van de spoelvloeistof.

4 **Verloop blaasspoeling**

Vóór elke toediening van BCG® vraagt de verpleegkundige of u bijwerkingen hebt opgemerkt tijdens of na de vorige blaasspoeling. Hiervoor brengt u dit document mee waar de eventuele bijwerkingen werden aangeduid. Zie checklijst onderaan deze brochure.

Voor we starten vragen wij u om te plassen, zodat de blaas zo leeg mogelijk is. Daarna verwijdert u uw onderkleding en neemt u plaats op de behandeltafel. De verpleegkundige plaatst een katheter (een flexibel, hol buisje) doorheen de plasbuis tot in de blaas. Dit is niet pijnlijk maar sommige mensen voelen dit aan als onaangenaam. De katheterisatie is nodig om de blaas volledig te ledigen. Via diezelfde katheter dienen we daarna BCG® toe in de blaas. Vervolgens verwijderen we de katheter.

5 **Wat te doen na blaasspoeling?**

Geen tot beperkte vochtinname tot 2 uur na de blaasinstillatie. Als u thuis plaspillen neemt, mag u deze 2 uur na de blaasspoeling innemen.

2 uur urine ophouden en in beweging blijven. Beweging zorgt ervoor dat de vloeistof zich goed verspreidt doorheen de blaas.

Als u last hebt van urineverlies of minder mobiel bent, kan er eventueel een verblijfskatheter worden geplaatst en blijft u gedurende een uur in het ziekenhuis.

Na het ophouden van het product is het noodzakelijk om veel te drinken (+/- 1.5 liter), zodat eventuele irritatie van de blaas zoveel mogelijk wordt vermeden .

Na het toedienen van BCG® is de urine troebel. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken.

6 Aanbevelingen

Bij BCG® volgt u best de volgende aanbevelingen.

- Urineer zittend (ook mannen)
- Spoel het toilet twee maal door met het deksel dicht tot 48 uur na de behandeling.
- Gebruik zoveel mogelijk hetzelfde toilet .
- Was na elke plasbeurt uw handen en geslachtsdelen met water en zeep. Doe dit telkens tot acht uur na het uitplassen van het product.
- Voeg tot 6 uur na de blaasspoeling, voor het doorspoelen van het toilet, een chloortablet aan de urine toe.
- Reinig het toilet minimaal één keer per dag met chloor.
- Geen geslachtsgemeenschap gedurende 1 week. Tot 6 weken na de behandeling moet u of uw partner een condoom gebruiken.

7 Belangrijkste bijwerkingen

Bijwerkingen van BCG zijn er persoonsgebonden. Sommige patiënten hebben geen last van bijwerkingen en anderen wel.

- Koorts meer dan 38.5°C
- Zeurend gevoel in de onderbuik en frequente aandrang.
- Allergische reactie (bv. jeuk aan de handen of voetzolen)
- Huiduitslag
- Bloed in de urine
- Algemene malaise, griepachtige verschijnselen. Bij

deze klachten mag u gerust paracetamol (bv. Dafalgan®) gebruiken. De klachten zijn normaal maar mogen niet langer dan twee dagen aanhouden. Als dit wel het geval is, verwittig dan uw huisarts of de behandelende uroloog.

Wanneer u plotseling helemaal niet meer kan plassen, is de oorzaak niet noodzakelijk de behandeling met BCG. Neem in dat geval meteen contact op met de raadpleging urologie of uw huisarts en vermeld ook dat u een behandeling hebt gekregen met BCG.

Ook in geval van hoge koorts (meer dan 39°C), rillingen, lage bloeddruk, snelle pols, verwardheid, blijvende gewrichtspijn, kortademigheid, jeuk over het hele lichaam en netelroos (erg jeukende uitslag van de huid waarbij eerst rode vlekken en nadien dikke bleke plekken verschijnen) is het nodig contact op te nemen met uw arts. Buiten de kantooruren of in het weekend neemt u contact op met uw huisarts (van wacht) of met de dienst spoedgevallen. Vermeld ook daar dat u een behandeling hebt gekregen met BCG.

8

Tussenkost vervoer

Er is een financiële vergoeding door het ziekenfonds voor het vervoer heen en terug naar het ziekenhuis. Er wordt op het einde van de behandeling een medisch attest opgestuurd dat u kunt binnenbrengen bij uw ziekenfonds. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sociale dienst in het ziekenhuis.

9

Kostprijs

Als u wenst te weten hoeveel de behandeling u ongeveer zal kosten kunt u contact opnemen met de dienst facturatie op het

nummer 051 23 62 05 of mailen naar factuur@azdelta.be

10 Checklijst

Als u wordt geconfronteerd met één van de volgende bijwerkingen duid dit dan aan op de lijst en breng deze mee bij uw volgende afspraak.

Had u na de blaaspoeling volgende klachten?	Ja of neen
Koorts (boven 38.5°C), indien ja hoeveel dagen	
Bloed bij het plassen, indien ja hoeveel dagen	
Pijn bij het urineren	
Meer dan gewoonlijk moeten plassen	
Huiduitslag: handen/voeten/geslachtsdelen/buik/rug/benen	
Moeheid	
Jeuk (plaats aanduiden)	
Gewrichtspijn	
Kortademigheid	
Grieperig gevoel	
Andere:	

Contact

Secretariaat dienst urologie

CAMPUS WILGENSTRAAT

t 051 23 70 08

CAMPUS MENEN

t 056 52 25 78

CAMPUS TORHOUT

t 050 23 24 36

www.azdelta.be

Bron: info dienst urologie

Artsen

Dr. Kristien Boel

Dr. Lieven Goeman

Prof. dr. Steven Joniau

Dr. Heleen Maes

Dr. Wouter Marchand

Dr. Hans Van der Eecken

Dr. Wim Van Haute

Dr. Jean-Louis Vanhoucke

Dr. Lieven Verhamme