

# Blaasspoeling



**azdelta**

Uw ziekenhuis.

# Inhoud

1. Wat zijn blaaspoliepen?	3
2. Hoe vaak vinden blaasspoelingen plaats?	3
3. Wat te doen vóór de blaasspoeling?	4
4. Wat tijdens de blaasspoeling?	4
5. Wat te doen na de blaasspoeling?	5
6. Aanbevelingen	5
7. Mogelijke bijwerkingen	6
8. Tussenkost vervoer	6
9. Kostprijs	7
10. Checklijst	7

## Beste patiënt

In deze brochure vindt u informatie over blaasspoelingen met **Mitomycine C®**. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat u één of verschillende oppervlakkige blaaspoliepen heeft en daarom stelde de arts deze behandeling voor.

Lees deze brochure aandachtig en hou ze zorgvuldig bij zodat u ze altijd kunt raadplegen. Tevens is dit document een werkinstrument voor u.

Indien u nog vragen heeft die in deze brochure niet behandeld worden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

De artsen en medewerkers van de dienst urologie

# 1 Wat zijn blaaspoliepen?

Blaaspoliepen zijn woekeringen van het slijmvlies van de blaas die het uitzicht hebben van een bloemkooltje. Poliepen zijn in de beginfase niet levensbedreigend, maar kunnen dit wel worden als ze verwaarloosd of niet behandeld worden.

Blaasspoelingen worden voorgeschreven om de kans dat deze poliepen terugkomen, te verkleinen. Nabehandeling en controle na de operatie zijn hierbij aangewezen.

Er zijn verschillende producten die voor blaasspoelingen worden gebruikt. Mitomycine C® is een product die een celdodend effect heeft op de poliep. We kunnen het beschouwen als een vorm van chemotherapie maar doordat het product rechtstreeks in de blaas wordt ingebracht, komt het niet in de bloedbaan terecht en hebt u geen last van bijwerkingen zoals haaruitval of misselijkheid.

# 2 Hoe vaak vinden blaasspoelingen plaats?

Blaasspoelingen zijn het meest doeltreffend wanneer ze volgens een welbepaald schema plaatsvinden. We starten met wekelijks blaasspoelingen (6), daarna zetten we ze

maandelijks (6) verder. We bespreken dit schema met u voor de start. Tijdens de behandelperiode ondergaat u regelmatig (1ste na 7 spoelingen, 2de na 4 maand) een controle in de vorm van een cystoscopie (kijken in de blaas). Belangrijk te vermelden is dat wanneer een bepaald product niet helpt, er overgeschakeld kan worden naar een ander type product. Dit wordt dan met u besproken.

## 3 Wat te doen vóór de blaasspoeling?

- Geen tot beperkte vochtinname tot 4 uur vóór de blaasspoeling.
- Geen diuretica nemen zoals bv. Lasix® of Burinex®. Zo voorkomt u dat er te veel urine in de blaas komt. Te veel urine in de blaas kan Mitomycine® te veel verdunnen waardoor de werking minder doeltreffend is. U kunt uw plaspillen (diuretica) terug innemen na het uitplassen van de spoelvlloeistof.

## 4 Wat tijdens de blaasspoeling?

Vóór elke toediening van Mitomycine® vraagt de verpleegkundige of u bijwerkingen hebt opgemerkt tijdens of na de vorige blaasspoeling. Hiervoor brengt u uw document mee waar de eventuele bijwerkingen werden aangeduid. Zie checklijst op het einde van deze brochure.

Voor we starten vragen wij u om te plassen, zodat de blaas zo leeg mogelijk is. Daarna verwijdert u uw onderkleding en neemt u plaats op de behandelafel. De verpleegkundige plaatst een katheter (een flexibel, hol buisje) doorheen de plasbuis tot in de blaas. Dit is niet pijnlijk maar sommige mensen voelen dit aan als onaangenaam. Katheterisatie is o.a. nodig om de blaas volledig te ledigen. Via diezelfde katheter dienen we daarna Mitomycine® toe in de blaas. Vervolgens verwijderen we de katheter.

## 5 Wat te doen na de blaasspoeling?

Geen tot beperkte vochtinname tot 2 uur na de blaasspoeling. Als u plaspillen neemt thuis, mag u deze 2 uur na de blaasspoeling weer innemen.

1 tot 2 uur urine ophouden en in beweging blijven (beweging zorgt ervoor dat de vloeistof zich goed verspreidt doorheen de blaas); als u last heeft van urineverlies of minder mobiel bent, kan er eventueel een verblijfskatheter worden geplaatst.

Na het ophouden van het product is het noodzakelijk om veel te drinken(+/- 1.5) liter, zodat eventuele irritatie van de blaas zoveel mogelijk wordt vermeden .

Na het toedienen van Mitomycine® is de urine blauwachtig gekleurd. Na het toedienen van Farmorubicine® is de urine rood gekleurd. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken.

## 6 Aanbevelingen

Omdat Mitomycine® een cytostaticum is, volgt u best volgende aanbevelingen.

- Urineer zittend (ook mannen)
- Spoel het toilet tweemaal door met het deksel dicht tot 48 uur na de behandeling.
- Gebruik zoveel mogelijk hetzelfde toilet.
- Was na elke plasbeurt uw handen en geslachtsdelen met water en zeep. Doe dit telkens tot acht uur na het uitplassen van het product .
- Reinig het toilet minimaal één keer per dag met een niet-agressieve pH-neutraal schoonmaakmiddel.
- Geen geslachtsgemeenschap gedurende twee dagen. Tot één week na de behandeling moet u of uw partner een condoom gebruiken.

## 7 Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen van Mitomycine® zijn erg persoonsgebonden. Sommige patiënten hebben geen last van bijwerkingen en anderen wel.

- Koorts meer dan 38.5°C
- Plasklachten zoals vaker of moeilijker plassen, pijnlijk of branderig plassen en/of bloed bij de urine zijn normale bijwerkingen.
- Een allergische reactie op Mitomycine® komt weinig voor. Als er toch een allergische reactie optreedt, uit zich dat door jeuk aan handen en voeten of aan de geslachtsdelen, al dan niet gepaard met afschilfering van de huid. Deze klachten zijn eerder vervelend maar vrij onschuldig. Meld de reactie toch in elk geval op de checklijst (zie op het einde van deze brochure). Dit is belangrijke informatie voor ons.
- Algemeen kunnen we stellen dat deze bijwerkingen normaal zijn. Indien deze echter langer dan 2 dagen aanhouden, contacteer uw huisarts of uroloog.

Wanneer u plotseling helemaal niet meer kan plassen, is de oorzaak niet noodzakelijk de behandeling met Mitomycine®. Neem in dit geval meteen contact op met uw huisarts of de raadpleging urologie en vermeld ook dat u een behandeling hebt gekregen met Mitomycine®.

Buiten de kantooruren of in het weekend neemt u contact op met uw huisarts (van wacht) of met de dienst spoedgevallen. Vermeld ook daar dat u een behandeling hebt gekregen met Mitomycine®.

## 8 Tussenkost vervoer

Er is een financiële tussenkost door het ziekenfonds voor het vervoer heen en terug naar het ziekenhuis. Er wordt op het einde van de behandeling een medisch attest opgestuurd dat u kunt binnendragen bij uw ziekenfonds. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sociale dienst in het

ziekenhuis.

## 9 **Kostprijs**

Als u wenst te weten hoeveel de handeling u ongeveer zal kosten kunt u contact opnemen met de dienst facturatie op het nummer 051 23 62 05 of mailen naar [factuur@azdelta.be](mailto:factuur@azdelta.be).

## 10 **Checklijst**

Als u wordt geconfronteerd met één van de volgende bijwerkingen gelieve dit dan ook aan te duiden op de lijst en deze mee te brengen bij uw volgende afspraak:

<b>Had u na de blaasinstillatie volgende klachten?</b>	<b>Ja / Neen</b>
Koorts (boven 38.5°C), indien ja hoeveel dagen	
Bloed bij het plassen, indien ja hoeveel dagen	
Pijn bij het urineren	
Meer dan gewoonlijk moeten plassen	
Huiduitslag: handen/voeten/genitaliën/buik/rug/benen	
Moeheid	
Jeuk (plaats aanduiden)	
Andere:	

# Contact

Secretariaat dienst urologie

## **CAMPUS WILGENSTRAAT**

**t** 051 23 70 08

## **CAMPUS MENEN**

**t** 056 52 25 78

## **CAMPUS TORHOUT**

**t** 050 23 24 36

[www.azdelta.be](http://www.azdelta.be)

*Bron: info dienst urologie, 18 juli 2018*

# Artsen

Dr. Kristien Boel

Dr. Lieven Goeman

Prof. dr. Steven Joniau

Dr. Heleen Maes

Dr. Wouter Marchand

Dr. Hans Van der Eecken

Dr. Wim Van Haute

Dr. Jean-Louis Vanhoucke

Dr. Lieven Verhamme