Afinitor

Hoe werkt Afinitor?

Afinitor is een selectieve remmer van het m-TOR eiwit. Bij vele gevallen van kanker is het m-TOR eiwit ontregeld, dit bevordert de groei van kankercellen.
Afinitor blokkeert de werking van dit eiwit.

Hoe in te nemen?

- Afinitor bestaat uit tabletten van 5 en 10 milligram. De dosis bedraagt 10 milligram éénmaal per dag.
- Afinitor dient 1 maal per dag te worden ingenomen, steeds op ongeveer hetzelfde uur.
- Afinitor kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
- De tablet is niet deelbaar. Ze moet in haar geheel worden ingeslikt met een glas water. De tablet mag niet worden gekauwd of verbrijzeld.
- Als u vergeten bent een tablet in te nemen, wacht dan gewoon tot de dag nadien om de volgende dosis in te nemen. Neem NOOIT een dubbele dosis.
- Bij nevenwerkingen kan uw arts de medicatie tijdelijk stoppen om dan eventueel nadien aan een lagere dosis te herstarten.
- De tabletten mogen NIET uit de verpakking worden gehaald om in een pillendoosje te bewaren. De tablet Afinitor moet in de verpakking worden bewaard tot het moment van inname, ter bescherming tegen licht of vochtigheid. Te bewaren kamertemperatuur en zeker ver buiten het bereik van kinderen houden.

Nevenwerkingen

Wanneer u een nevenwerking ondervindt, neem dan steeds onmiddellijk contact op met uw behandelend arts om te vermijden dat de nevenwerkingen te ernstig worden.

Mogelijke nevenwerkingen:

- **Diarree.** U kan hiervoor Imodium tot 6/dag innemen. Bij ernstige diarree of bij aanhoudende diarree langer dan 24 uur, begeeft u zich best naar het ziekenhuis of neemt u

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 15/07/2020 0520 5981-NL

contact op met uw behandelend arts.
- **Vermoeidheid en futloosheid.**
- **Misselijkheid en braken.**
- **Huiduitslag, droge huid, jeuk.** Gebruik een hydraterende crème bij droge huid. Bij huiduitslag of jeuk neemt u best contact op met uw behandelend arts.
- **Mondontsteking**: branderig gevoel, gevoelig tandvlees, aften of ontstekingen. Gebruik preventief een zachte tandenborstel en spoel de mond regelmatig met een ontsmettende mondspoeling zoals Perio-aid. Neem onmiddellijk contact op met uw arts bij ernstige ontstekingen!
- **Dalen van de witte bloedcellen met een verhoogd risico op infecties**. Neem bij koorts of infectie steeds onmiddellijk contact op met uw behandelend arts.
- **Verhoogde vatbaarheid voor** bacteriële, virale of schimmelinfecties. Verwittig bij symptomen van een infectie (koorts, hoesten, rillingen, spierpijn zoals bij griep...) onmiddellijk uw behandelend arts en stop de behandeling met Afinitor.
- **Kortademigheid en prikkelhoest** door ontsteking op de longen (= pneumonitis). Neem bij ontstaan van klachten onmiddellijk contact op met uw behandelend arts en stop **onmiddellijk** de medicatie!
- **Verminderde of veranderde smaak.**
- **Verhoging van suiker en cholesterol.**
- **Overgevoeligheidsreacties** met plotse kortademigheid, pijn op de borstkas, zwelling van de tong/keel en gelaat.., zijn zeldzaam maar kunnen optreden. Als dit optreedt, verwittig dan onmiddellijk uw behandelend arts of bel de 100 bij ernstige klachten.

Andere geneesmiddelen

Sommige geneesmiddelen beïnvloeden de werking van Afinitor en andersom geldt hetzelfde. Hierdoor kan de werking van Afinitor verminderd worden of kunnen er zich anderzijds soms meer nevenwerkingen voordoen.

- Licht uw arts steeds in van alle medicatie die u neemt, ook kruiden en/of homeopathische middelen.
- Vermijd medicatie tegen schimmel (fluconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole, ketoconazole).
- Vermijd cortisonemedicatie (dexamethasone, prednisone,

prednisolone).
- Vermijd het gebruik van sint-janskruid.
- Geen gebruik van macrolide antibiotica of calciumantagonisten zoals verapamil of diltiazem.
- Drink geen pompelmoessap of eet geen pompelmoes.
- Start geen nieuwe geneesmiddelen zonder dit met uw arts te overleggen.

Contact

Nog vragen? Neem gerust contact op.
Zie contactinfo vooraan in uw mapje.