Carboplatinum Taxol

De hiernavolgende gecombineerde chemotherapie- behandeling met Carboplatinum en Taxol zal u op één bepaalde dag iedere week worden toegediend.

Uw behandelend arts zal samen met u bespreken hoeveel behandelingen u dient te krijgen.
Deze therapie wordt bij bepaalde types borstkanker gecombineerd met Herceptin of de combinatie van Herceptin en Perjeta (zie aparte folder)

Deze behandeling bestaande uit een bloedafname, een consultatie bij uw behandelende arts en de toediening van de medicatie, zal ongeveer een halve dag duren. Het is ook raadzaam dat u zich, zeker voor de eerste behandeling, laat begeleiden door een familie / kennis.

Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u zal toegediend worden, met hun eventuele mogelijke nevenwerkingen. Alle medicatie wordt in afzonderlijke infuuszakjes klaargemaakt, en via een infuusleiding in een bloedvat ingebracht.

Misselijkheid

Chemotherapie kan de eerste dagen misselijkheid of een zware maag geven.
U krijgt voor de start van de baxters medicatie in pilvorm tegen de misselijkheid. U krijgt nog medicatie mee naar huis om thuis verder in te nemen.

De medicatie tegen de misselijkheid die u krijgt in het ziekenhuis onder de naam van Akynzeo kan constipatie (harde stoelgang) geven. U kan hiervoor zo nodig Movicol siroop innemen (1-3 zakjes per dag).
Chemotherapie kan ook smaakverandering geven.

U mag in principe alles eten en drinken. Het kan soms helpen om frequenter kleinere hoeveelheden te eten.
U kan altijd vragen dat de diëtiste langskomt op het dagziekenhuis.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 22/10/2021 0520 6196-NL

Carboplatinum

Carboplatinum is één van de chemotherapie producten die u zal toegediend krijgen. Carboplatinum is een kleurloos product dat in een infuuszakje van 500 ml opgelost wordt. Het zal u over ongeveer 30 minuten worden toegediend.
Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, eventueel misselijkheid, braken of verminderde eetlust, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken.

- **Een laag aantal witte bloedcellen**. U kan hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts, en bij een temperatuur van 38°C of hoger, moet u de arts hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Ook wanneer u een infectie heeft (met of zonder koorts) zoals een verkoudheid, blaasontsteking,.. moet u altijd zo snel mogelijk uw arts raadplegen.
- Soms kan er ook een **stoornis optreden van uw nierfunctie**. U kan hier zelf niets voor doen, maar uw arts zal voor elke nieuwe behandeling uw bloedwaarden hierop controleren. Sommige andere medicatie kunnen ook nierproblemen veroorzaken indien samen ingenomen met deze chemotherapie. Bespreek daarom iedere medicatie verandering met uw arts.

Taxol

Taxol is het andere chemotherapie product dat u zal worden toegediend. Het product is kleurloos en het wordt opgelost in een infuuszak van 250 milliliter over 1 uur.

Taxol kan allergische reacties veroorzaken. U zal op de dagkliniek kort voor de start van de baxter medicatie krijgen ter preventie van een allergische reactie op Taxol. U kan van deze medicatie een beetje slaperig zijn. Bovendien zal u voor de eerste en de tweede toediening de avond voor de chemotherapie 1 capsule Dexamethasone moeten innemen thuis en dit met de bedoeling om de mogelijks allergische reactie te voorkomen. Als de behandeling goed verdragen wordt, dan zal u vanaf de derde

toediening geen Dexamethasone capsule meer moeten innemen de avond voordien. Uw arts en de verpleegkundige op de dagkliniek zullen u dit alles duidelijk uitleggen.

- **Volledige haaruitval**. Ter preventie van haaruitval kan een **ijskap** gedragen worden tijdens de behandeling.
- **Een laag aantal witte bloedcellen**. U kan hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts, en **bij een temperatuur van 38°C of hoger, moet u de arts hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen**. Ook wanneer u een infectie heeft (met of zonder koorts) zoals een verkoudheid, blaasontsteking,.. moet u altijd zo snel mogelijk Uw arts raadplegen.
- **Prikkelingen of zinderingen** ter hoogte van de vingertoppen en voetzolen. Indien dit zo is, gelieve dit dan steeds aan uw arts te vermelden. Meestal verbeteren deze klachten na het stoppen van de behandeling.
- **Spier-en gewrichtspijn**: meestal enkele dagen na de toediening. Hiervoor kan u Dafalgan (paracetamol) innemen. Indien dit niet volstaat, neem dan contact op met uw huisarts of specialist voor een sterkere pijnstiller. Deze klachten verdwijnen over het algemeen na enkele dagen. U meldt deze nevenwerking ook best aan uw arts bij de volgende behandeling.
- **Vermoeidheid**.
- **Allergische reactie**. Kort na de opstart van Taxol kan u (zeldzaam) een allergische reactie doen. Krijgt u kort na de start van de baxter klachten zoals jeuk, roodheid in het gelaat, kortademigheid, druk op de borstkas, pijn in de rug,... verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige op de dagkliniek. Aangezien het grootste risico op allergische reacties bij de eerste twee kuren wordt gezien zal de verpleegkundige van de dagkliniek bij de start van toediening 1 en 2 minstens 5 minuten bij u in de kamer blijven.
- **Nageltoxiciteit**. Taxol kan de nagels brozer maken of wat van kleur doen veranderen. Gebruik zeker geen nagellak. Zorg dat de nagels steeds mooi kort geknipt zijn. De borstverpleegkundige kan u advies geven omtrent nagelverzorging.

Naspoelen

Nadat de medicatie werd toegediend, zal de verpleegkundige nog een laatste infuuszakje met fysiologisch water aanhangen, met de bedoeling naast het voorkomen van irritatie van uw bloedvaten, u alle medicatie uit de infuusleiding eveneens toe te dienen. Op die manier zal u de voorgeschreven dosis volledig gekregen hebben.

Aarzel bij problemen niet om contact op te nemen met uw behandelend arts.