Chemotherapie: Carboplatinum - Gemcitabine

De gecombineerde chemotherapie-behandeling met Carboplatinum en Gemcitabine zal u om de 3 weken toegediend worden. Op de eerste dag van de behandeling krijgt u de 2 producten toegediend. Op de 8° dag (dus 1 week later) krijgt u enkel Gemcitabine. Nadien volgt er 1 week rust. Dit schema wordt soms individueel aangepast.

Het aantal van dergelijke cycli die u zal krijgen, is afhankelijk van hoe uw lichaam op deze medicatie reageert.

Deze behandeling bestaat uit een bloedafname, een raadpleging bij uw arts en de toediening van de medicatie, en duurt ongeveer een halve dag.

Hieronder vindt u meer informatie over de medicatie die u zal krijgen met de eventuele mogelijke nevenwerkingen. Alle medicatie wordt in afzonderlijke infuuszakjes klaargemaakt en via een infuusleiding in een bloedvat ingebracht.

Medicatie misselijkheid

Deze behandeling kan misselijkheid en smaakverandering veroorzaken. De diëtiste kan altijd eens langskomen bij u op het dagziekenhuis voor extra informatie in verband met voeding.

Kort voor het inlopen van de chemotherapiebaxter, krijgt u van de verpleegkundige in het dagziekenhuis een aantal tabletten tegen misselijkheid.
U krijgt Litican mee naar huis om in te nemen als u thuis misselijk zou worden. U mag tot 6 tabletten Litican per dag innemen.

Gemcitabine

Gemcitabine is een chemotherapieproduct. U krijgt dit product op dag 1 van uw behandeling in combinatie met Carboplatinum. Op de 8° dag van de cyclus krijgt u dit

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 28/09/2022 0520 6250-NL

product alleen toegediend.
Het product is kleurloos en het infuuszakje van 250 ml waarin het product is opgelost, loopt ongeveer 30 minuten in via het infuus.

Gemcitabine wordt door de meeste patiënten vrij goed verdragen. Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, verminderde eetlust en een daling van uw aantal witte bloedcellen, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken.

- **Misselijkheid en/of braken**
  Na uw behandeling kan voorkomen. U kunt daarvoor het antibraakmiddel Litican innemen.

- **Een laag aantal witte bloedcellen**
  U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts en **bij een temperatuur van 38° C of hoger moet u de arts hiervan op de hoogte brengen**. Ook bij een infectie (met of zonder koorts!) zoals een verkoudheid, blaasontsteking... moet zo snel mogelijk uw arts raadplegen. Op de derde week (= therapievrije week) laat u bloed prikken bij de huisarts om de weerslag van de behandeling op de bloedwaarden na te gaan.

- **Bloedplaatjes**
  Ook uw bloedplaatjes, die instaan voor uw bloedstolling (bv. stelpen van bloeding uit een wonde...) kunnen gaan dalen. Bij verhoogde bloedingsneiging (bv. moeilijk te stelpen bloedneus, bloedend tandvlees...) raadpleegt u zo snel mogelijk uw arts om een bloedafname te plannen.

- **Allergische huidreacties**
  Bij 1 op de 4 patiënten treden allergische huidreacties op tijdens of na de toediening van Gemcitabine. Deze uiten zich in het optreden van huiduitslag al of niet samen met jeuk. Deze nevenwerking verdwijnt meestal spontaan.

- **Lichte koorts, hoofdpijn, rillingen en spierpijn**
  Symptomen zoals lichte koorts, hoofdpijn, rillingen en spierpijn alsof u een beginnende griep doormaakt, komen voor bij 1 op de 5 patiënten

die met Gemcitabine behandeld worden. Mochten deze symptomen bij u optreden dan mag u gerust Dafalgan gebruiken, maar u meldt dit best bij een volgende raadpleging bij uw arts.

- **Vochtophoping**
  Bij ongeveer 1 op de 3 patiënten treden lichte vormen van oedeem (vochtophopingen) op ter hoogte van de handen, voeten en/of aangezicht. Deze klachten moeten doorgaans niet behandeld worden en verdwijnen spontaan na het stoppen van uw behandeling.

- **Lichte haaruitval**
  kan ook optreden maar is eerder zeldzaam.

- **Slaperigheid**
  Dit kan bij de behandeling met Gemcitabine optreden als bijwerking. Wij raden u dan ook aan hiermee rekening te houden wanneer u zelf uw wagen wil besturen.

Carboplatinum

Carboplatinum is het andere chemotherapeuticum dat u zal toegediend worden en dit enkel op dag 1 van elke cyclus van uw behandeling. Carboplatinum is een kleurloos product dat in een infuuszakje van 500 ml opgelost wordt. Het wordt toegediend over een tijdspanne van 60 minuten.

Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, eventueel misselijkheid en braken of verminderde eetlust, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken.

- Een **laag aantal witte bloedcellen**
  U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts, en **bij een temperatuur van 38° C of hoger, moet u de arts hiervan op de hoogte brengen.**

- **Stoornis optreden in de nierfunctie**
  U kunt hier zelf ook niets voor doen, maar uw arts zal vóór elke nieuwe behandeling uw bloedwaarden hierop controleren. Neem thuis geen

medicatie die invloed kan hebben op de nierfunctie. Bespreek daarom steeds een eventuele verandering van de thuismedicatie met uw arts.

Naspoelen

Nadat alle medicatie werd toegediend, krijg u nog een laatste infuuszakje met fysiologisch water. Dat gaat irritatie van uw bloedvaten tegen en zorgt er ook voor dat u de laatste medicatie uit de infuusleiding toegediend krijgt. Op die manier krijgt u de voorgeschreven dosis volledig..