

Chemotherapie Trastuzumab-Deruxtecan

Deze behandeling krijgt u via een baxter om de drie weken in het dagziekenhuis.

Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u zal krijgen, met de eventuele mogelijke nevenwerkingen.

Wat is Trastuzumab-deruxtecan?

Deze behandeling bestaat uit een combinatie van 2 producten die via éénzelfde baxter worden toegediend.

Trastuzumab is een antistof die zich bindt aan het Her2/neu eiwit dat aanwezig is op de kankercellen waardoor de groei van kankercellen stopt. Deruxtecan is een chemotherapie die eveneens de groei van kankercellen stopt.

Hoe wordt de behandeling toegediend?

De behandeling wordt toegediend via een baxter (infuus). De eerste toediening loopt in over 90 minuten. Als dit goed verdragen wordt, dan zullen de volgende toedieningen inlopen over 30 minuten.

Nevenwerkingen

- **Misselijkheid en braken.**

Je zal kort voor de toediening in het dagziekenhuis 1 capsule met dexamethasone (cortisone) en 1 tablet Akynzeo krijgen en dit om misselijkheid door de behandeling zo veel mogelijk te vermijden. Dexamethasone kan enkele dagen een lichte gloeiing in het gelaat geven. Akynzeo kan soms constipatie (harde en moeilijke stoelgang) geven. U kunt hiervoor zo nodig Movicolsiroop 1-3 zakjes per dag innemen. Als u de dagen na de behandeling thuis nog last hebt van misselijkheid, dan kunt u Litican tot 6 tabletten per dag innemen.



- **Haaruitval**
Bij een derde van de patiënten kan er soms ernstige haaruitval zijn.
- **Dalen van de witte bloedcellen**
Dit is een nevenwerking die regelmatig voorkomt en meestal optreedt rond de tiende dag. U kunt hier zelf niets aan doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. Controleer daarom regelmatig uw koorts, en **bij een temperatuur van 38° C of hoger moet u uw arts hiervan onmiddellijk verwittigen en naar het ziekenhuis komen**. Ook bij een infectie (bronchitis, sinusitis, blaasontsteking...) moet u onmiddellijk de arts verwittigen om bloed te prikken en antibiotica te starten.
- **Kortademigheid of prikkelhoest**
Trastuzumab-Deruxtecan kan zelden een soort reactie op de longen veroorzaken. Als u klachten ontwikkelt zoals kortademigheid of een prikkelhoest, dan moet u uw arts hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
- **Verminderde werking van het hart**
De behandeling kan in zeldzame gevallen een verminderde werking van het hart veroorzaken. Zo nodig zal een echografie van het hart gebeuren.
- **Algemeen onwel voelen**
Dit is een reactie op de behandeling tijdens het inlopen van de baxter met klachten zoals algemeen onwel voelen, huiduitslag, gevoel van benauwdheid, zweten, koorts, rillingen of lage bloeddruk. Soms gaat een reactie gepaard met een gevoel van misselijkheid of overmatig transpireren. Als u ongemakken ondervindt tijdens de toediening, verwittig de verpleegkundige van het dagziekenhuis dan onmiddellijk.
- **Vermoeidheid**

Aarzel bij problemen niet om contact op te nemen met uw arts, de borstverpleegkundige of de verpleegkundigen van het dagziekenhuis.