Chemotherapie Trodelvy

De werkzame stof in Trodelvy, sacituzumab-govitecan, bestaat uit 2 werkzame bestanddelen : een antilichaam met hieraan gekoppeld een molecule SN-38 genaamd. SN-38 is een soort chemotherapie.
Het antilichaam herkent het TROP-2 eiwit dat aanwezig is op de borstkankercellen. Als het antilichaam hecht aan de borstkankercel, wordt het door de cel opgenomen waarna het SN-38, de chemotherapie, actief wordt in de cel.
Zo worden kankercellen heel gericht aangevallen en vernietigd.

Toediening

Trodelvy wordt toegediend via een infuus op dag 1 en dag 8 , nadien volgt 1 week rust. De behandeling herhaalt zich om de drie weken.
De eerste toediening zal lopen over 3 uur. Als de baxter goed verdragen wordt, dan zullen de volgende toedieningen lopen over 1 tot 2 uur.
In het dagziekenhuis zal voor iedere toediening een bloedafname gebeuren en zal u gevraagd worden naar mogelijke nevenwerkingen.

Mogelijke nevenwerkingen

- **Infusie gerelateerde reactie**
  U kunt reageren op de baxter. Dit kan zich uiten onder de vorm van jeuk, huiduitslag, rillingen, kortademigheid...
  Alle patiënten worden tijdens de infusie en gedurende ten minste 30 minuten erna gecontroleerd op reacties op de baxter. Deze reacties kunnen ernstig zijn en om het risico hierop te verminderen, krijgt u als patiënt preventief geneesmiddelen vooraleer de baxter opstart.

- **Misselijkheid**
  Voor de start van de behandeling krijgt u van de verpleegkundige medicatie tegen misselijkheid: 1 tablet Akynzeo en 1 capsule Dexamethasone.
  Akynzeo kan constipatie geven waarvoor zo nodig Movicol siroop (1 tot 3 zakjes per dag) op te lossen in een glas water.
  Dexamethasone is een vorm van cortisone en kan enkele dagen een gloeiing in het gelaat geven.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 10/02/2023 0520 6337-NL

U krijgt Motilium instantsmelttabletten mee naar huis. U mag thuis tot 6 tabletten per dag innemen bij misselijkheid. U laat de tabletten smelten onder de tong.

- **Dalen van de witte bloedcellen**
  Dit is een nevenwerking die regelmatig voorkomt. Let op voor mogelijke infecties. **Bij een temperatuur van 38° C of hoger moet u uw arts hiervan onmiddellijk verwittigen en naar de spoed komen.** Ook bij een infectie (bronchitis, sinusitis, blaasontsteking...) moet u onmiddellijk uw huisarts of behandelend arts verwittigen om bloed te prikken en antibiotica te starten. U zal steeds een **spuitje Lonquex** meekrijgen om **daags na de tweede behandeling** (dus op dag 9) door de huisarts te laten toedienen. Dit spuitje is een groeifactor voor de witte bloedcellen. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de witte bloedcellen niet te lang laag zakken. Hoe korter de periode van lage witte bloedcellen, hoe kleiner het risico op een infectie. Deze inspuiting kan verantwoordelijk zijn voor (soms hevige) pijn laag in de rug of ter hoogte van het borstbeen. Dit is ten gevolge van een toegenomen productie van witte bloedcellen in het beenmerg. U kan hiervoor een pijnstiller zoals Dafalgan innemen of zo nodig sterkere pijnstillers in samenspraak met de huisarts of behandelende arts. (NSAID zoals Brufen, Voltaren...)

- **Diarree**
  De behandeling kan diarree geven die soms ernstig kan zijn. Neem **bij diarree onmiddellijk 2 tabletten Imodium** in en neem **nadien 1 tablet in na iedere losse stoelgang**. U mag maximaal 6 tabletten Imodium innemen.
  Verwittig snel uw arts bij uitgesproken diarree.

- De behandeling kan **haarverdunning** en soms **volledige haaruitval** veroorzaken.

- **Vermoeidheid**

- **Bloedarmoede**
  De behandeling kan de rode bloedcellen doen dalen en zo bloedarmoede veroorzaken. Bloedarmoede maakt dat u er bleker uitziet en dat u sneller vermoeid, kortademig of duizelig kan zijn.

Nadat alle medicatie werd toegediend, zal de verpleegkundige nog een laatste infuuszakje met fysiologisch water aanhangen, met de bedoeling u alle medicatie uit de infuusleiding toe te dienen. Op die manier krijgt u de voorgeschreven dosis volledig toegediend.

Aarzel bij problemen niet om contact op te nemen met uw arts.