

# Herceptin

Herceptin is geen chemotherapie. Het product werkt in op een speciaal eiwit dat op de tumorcellen zit. Dit eiwit is in te grote hoeveelheid aanwezig op de kwaadaardige cellen en doet de cellen groeien. Herceptin blokkeert dit eiwit en neemt de groei stimulus van de kwaadaardige cellen weg.

## Verloop behandeling

Herceptin wordt door middel van een prikje in de dij om de drie weken toegediend in het dagziekenhuis.

De totale duur van de behandeling met Herceptin bedraagt 1 jaar. Dit wil zeggen 18 toedieningen om de drie weken. Herceptin wordt altijd gedurende enkele weken of maanden gecombineerd met chemotherapie. Ook Perjeta kan aan de behandeling worden toegevoegd. Zie aparte folders.

Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u krijgt toegediend met hun eventuele mogelijke nevenwerkingen..

## Herceptin

Korte inspuiting van 5-10 minuutjes in de dij. De prik wordt meestal zeer goed verdragen.

## Mogelijke nevenwerkingen

- **Misselijkheid en braken:**

Is meestal erg mild. Gebruik indien nodig Litan 4 tot 6 tabletten per dag. Litan is een medicijn tegen misselijkheid.

- **Overgevoeligheidsreactie**

Algemeen onwel voelen, zweten, bloeddruk veranderingen (zelden). Als u ongemakken ondervindt tijdens de toediening, zeg dit onmiddellijk tegen de verpleegkundige die de inspuiting geeft.



- **Diarree of dunnere stoelgang.**

In erge gevallen mag u Imodium innemen.

- **Vermindering van de hartfunctie**

Is zeldzaam. Tijdens uw behandeling zal op regelmatige tijdstippen de werking van uw hart worden gecontroleerd door middel van een echografie van het hart.

## Contact

Nog vragen? Neem gerust contact op.  
Zie contactinfo vooraan in uw mapje.