

Kadcyla

Kadcyla is een combinatie van Herceptin en een chemotherapie product genaamd Emtansine samengebundeld in 1 infuuszakje.

Herceptin is geen chemotherapie. Het product werkt in op een speciaal eiwit dat op de tumorcellen zit, het Her2/Neu eiwit genaamd. Dit eiwit is in te grote hoeveelheid aanwezig op de kwaadaardige cellen en doet de cellen groeien. Herceptin blokkeert dit eiwit en neemt de groeistimulus van de kwaadaardige cellen weg.

Emtansine is chemotherapie, dit is dus medicatie die de kankercellen rechtstreeks kapot maakt.

Verloop behandeling

Deze behandeling krijgt op één bepaalde dag in de week toegediend. De behandeling zal 3-wekelijks, telkens op ongeveer dezelfde dag herhaald worden. In totaal worden 14 toedieningen gepland.

Deze behandeling bestaande uit een bloedafname, een raadpleging bij uw behandelende arts en de toediening van de medicatie, zal ongeveer een halve dag duren. Het is ook raadzaam dat u zich, zeker voor de eerste behandeling, laat begeleiden.

Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u zal worden toegediend, met hun eventuele mogelijke nevenwerkingen.

Litican en Medrol

Litican is een middel om eventuele misselijkheid en/of braken zoveel mogelijk te beperken. Het product wordt met een klein spuitje rechtstreeks in de infuusleiding toegediend.

Na het beëindigen van uw behandeling, krijgt u van de verpleegkundige een aantal tabletten van dit product mee naar huis. De tabletten kunt u volgens noodzaak innemen (tot 6 per dag) met een beetje water, steeds een half uur vóór de maaltijd.



U krijgt voor de start van Kadcykla 1 tablet Medrol 32 mg, dit is cortisone. Medrol helpt tegen de misselijkheid en is eveneens ter preventie van een allergische reactie op Kadcykla.

Medrol kan gedurende een tweetal dagen wat gloeiing in het gelaat veroorzaken.

Kadcykla

Kadcykla is het combinatieproduct van Herceptin en chemotherapie in 1 infuuszakje.. Het infuuszakje heeft een volume van 250 ml. De eerste maal wordt de behandeling toegediend over 90 minuten, alle andere cycli is dit over 30 minuten.

Mogelijke nevenwerkingen

- **Misselijkheid**

Meestal niet uitgesproken. U kunt hiervoor Litican tot 6x1 tablet per dag innemen.

- **Een laag aantal witte bloedcellen**

U kan hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. **Controleer daarom dagelijks uw koorts, en bij een temperatuur van 38°C of hoger, moet u de arts hiervan op de hoogte brengen en u naar de spoedgevallen begeben..** Ook als u een infectie hebt zonder koorts (bv. verkoudheid, blaasontsteking...) moet u steeds zo snel mogelijk uw huisarts of behandelend arts verwittigen. Een tiental dagen na de chemotherapie moet u bloed laten prikken bij de huisarts om de weerslag van de behandeling op de bloedcellen te evalueren.

- **Laag aantal bloedplaatjes**

Bij verhoogde bloedingsneiging (bv. moeilijk te stelpen bloedneus, bloedend tandvlees...) moet u steeds zo snel mogelijk uw arts raadplegen om een bloedafname te plannen.

- **Overgevoeligheidsreactie**

Tijdens inlopen van het product. Deze komen meestal voor bij de eerste toediening. U kunt plots een beklemmend gevoel krijgen en wat

kortademig worden. Uw bloeddruk kan dalen en u kunt een versnelde pols hebben. Rillingen en koorts kunnen hier ook toe behoren. Als u hinder ondervindt, verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige in het dagziekenhuis. Deze zal het infuus wat trager laten lopen of stopzetten. De verpleegkundige zal ook vóór en na elke behandeling uw bloeddruk en pols controleren.

- **Afwijken van de leverfunctiewaarden in het bloed**

Dit wordt telkens gecontroleerd tijdens de bloedafname in het dagziekenhuis en bij de huisarts.

- **Vermindering van de hartfunctie**

Zeer zeldzaam

- **Huiduitslag**

- **Mondslimvliesontsteking**

5 tot 10 dagen na de behandeling. Een heel goede mondhygiëne is aan te raden (meermaals per dag tanden poetsen met een zachte tandenborstel). Ook het gebruik van sterk irriterende spijzen zoals kruiden, mosterd..., zijn beter te vermijden. Mocht u hiervan toch last hebben, dan moet u dit zeker melden aan uw arts, die u een mondspoelmiddel zal voorschrijven.

- **Diarree**

- **Vermoeidheid**

Contact

Nog vragen? Neem gerust contact op.
Zie contactgegevens vooraan in uw mapje.