# Navelbine

Deze chemotherapiebehandeling zal u op één bepaalde dag in de week toegediend krijgen en dit 2 weken na elkaar, gevolgd door 1 week rust. Soms wordt dit product ook volgens een ander tijdsschema toegediend.

Deze behandeling bestaande uit een bloedafname, een raadpleging bij uw behandelende arts en de toediening van de medicatie, zal ongeveer een halve dag duren. Het is ook raadzaam dat u zich, zeker voor de eerste behandeling, laat begeleiden door een kennis.

Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u zal worden toegediend, met hun eventuele mogelijke nevenwerkingen. Alle medicatie wordt in afzonderlijke infuuszakjes klaargemaakt, en via een infuusleiding in een bloedvat ingebracht.

## Litican

Dit is een middel om eventuele misselijkheid en/of braken zoveel mogelijk te beperken.
Na het beëindigen van uw behandeling, zal u van de verpleegkundige een aantal tabletten van dit product meekrijgen naar huis. De tabletten kan u volgens noodzaak innemen (tot 6 per dag).

## Navelbine

Navelbine is een chemotherapieproduct dat u toegediend zal worden. Het product is kleurloos, en werd opgelost in een infuuszakje van 50 ml. Het zal u in 10 minuten toegediend worden.

Dit product is erg prikkelend voor de aders en voor de huid. Daarom zal er steeds een port-a-cath of poortcatheter worden geplaatst.

azdelta
Uw ziekenhuis.

**Deze brochure is laatst aangepast op 15/07/2020** 0520 5974-NL

Naast de klassieke nevenwerkingen zoals vermoeidheid, misselijkheid en braken, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal minder voorkomende ongemakken:

- **Een daling van uw aantal witte bloedcellen**: u kunt hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. Controleer daarom regelmatig uw koorts en **bij een temperatuur van 38° C of hoger moet u de arts hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.** Ook bij tekens van infectie (hoesten...) dient u onmiddellijk uw arts te verwittigen.
- **Haaruitval**: slechts in 4 procent van de behandelde patiënten wordt haaruitval gezien. Deze kan tijdens de behandeling geleidelijk optreden. Totale haaruitval komt echter nooit voor.
- **Obstipatie** (verharde stoelgang). U mag een laxativa zoals Movicol siroop of Forlax 1 tot 3 zakjes per dag innemen.
- **Tintelingen in de vingertoppen.**

## Contact

Nog vragen? Neem gerust contact op.
Zie contactgegevens vooraan in uw mapje.