Taxol wekelijks

Bij deze therapie wordt Taxol wekelijks toegediend in het dagziekenhuis. De behandeling duurt 12 weken. Afhankelijk van het behandelingsschema wordt er soms een rustweek ingepland.

Verloop van de behandeling

Deze behandeling bestaande uit een bloedafname, een raadpleging bij uw behandelende arts en de toediening van de medicatie, zal ongeveer een halve dag duren.
Het is ook raadzaam dat u zich, zeker voor de eerste behandeling, laat begeleiden door familie of een kennis.

Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u zal worden toegediend, met hun eventuele mogelijke nevenwerkingen. Alle medicatie wordt in afzonderlijke infuuszakjes klaargemaakt en via een infuusleiding in een bloedvat ingebracht.

Litican

Dit is een medicijn dat wordt gebruikt tegen de misselijkheid.
U krijgt van de verpleegkundige een aantal tabletten Litican mee om thuis in te nemen bij misselijkheid. U mag zonder probleem tot 6 tabletten per dag innemen en dit zolang als het nodig is.

Taxol

Taxol is het chemotherapieproduct dat u krijgt toegediend. Het product is kleurloos en het wordt opgelost in een infuuszak van 250 milliliter in een tijdspanne van 1 uur.

Taxol kan allergische reacties veroorzaken. U krijgt in het dagziekenhuis kort voor de start van de baxter medicatie ter preventie van een allergische reactie op Taxol. U kunt van deze medicatie een beetje slaperig zijn. Bovendien zal u thuis voor **de eerste en de tweede toediening de avond voor de chemotherapie 1 tablet Dexamethasone** moeten innemen, allemaal met de bedoeling om mogelijk een allergische reactie te voorkomen.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 30/09/2021 0520 5969-NL

Mogelijke nevenwerkingen

- **Haaruitval**

- **Een laag aantal witte bloedcellen**
  U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts, en **bij een temperatuur van 38°C of hoger, moet u de arts hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.** Ook wanneer u een infectie heeft (met of zonder koorts) zoals een verkoudheid, blaasontsteking.. moet u altijd zo snel mogelijk uw arts raadplegen.

- **Neuropathie**
  Bij 2 op 3 van de patiënten komen soms prikkelingen of zinderingen ter hoogte van de vingertoppen en voetzolen voor. Als dit zo is, meld dit dan steeds aan uw arts. Meestal verbeteren deze klachten na het stoppen van de behandeling.

- **Spier-en gewrichtspijn**
  Komt meestal voor enkele dagen na de toediening. Hiervoor kunt u Dafalgan (paracetamol) innemen. Als dit niet volstaat, neem dan contact op met uw huisarts of specialist voor een sterkere pijnstiller. Deze klachten verdwijnen over het algemeen na enkele dagen. U meldt deze nevenwerking ook best aan uw arts bij de volgende behandeling.

- **Vermoeidheid**

- **Allergische reactie**
  Kort na de opstart van Taxol kunt u (in zeldzame gevallen) een allergische reactie doen. Krijgt u kort na de start van de baxter klachten zoals jeuk, roodheid in het gelaat, kortademigheid, druk op de borstkas, pijn in de rug... verwittig dan onmiddellijk de verpleegkundige in het dagziekenhuis.
  Aangezien het grootste risico op allergische reacties optreedt bij de eerste twee kuren, blijft de verpleegkundige van het dagziekenhuis bij de start van toediening 1 en 2 minstens 5 minuten bij u in de kamer.

- **Nageltoxiciteit**
  Taxol kan de nagels brozer maken of wat van kleur doen veranderen. U kunt preventief de nagels kort vijlen en een goede, vochtinbrengende creme of olie aanbrengen ter hoogte van de nagel en nagelriem.
  Vermijd het gebruik van nagellak.

Naspoelen

Nadat de medicatie werd toegediend, zal de verpleegkundige nog een laatste infuuszakje met 100 ml fysiologisch water aanhangen, met de bedoeling naast het voorkomen van irritatie van uw bloedvaten, u alle medicatie uit de infuusleiding eveneens toe te dienen. Op die manier krijgt u de voorgeschreven dosis volledig toegediend.

Contact

Nog vragen? Neem gerust contact op.
Zie contactinformatie vooraan in uw mapje.