

# Taxotère - Cyclofosfamide

Deze chemotherapiebehandeling zal u op één bepaalde dag toegediend krijgen, telkens gevolgd door 3 weken rust. In totaal zullen 4-6 cycli worden gepland.

Deze behandeling bestaande uit een bloedafname, een raadpleging bij uw behandelende arts en de toediening van de medicatie, zal ongeveer een halve dag duren. Het is ook raadzaam dat u zich, zeker voor de eerste behandeling, laat begeleiden.

Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u zal worden toegediend, met hun eventuele mogelijke nevenwerkingen. Alle medicatie wordt in afzonderlijke infuuszakjes klaargemaakt en via een infuusleiding in een bloedvat ingebracht.

## Medicatie misselijkheid

U zal van de verpleegkundige in het dagziekenhuis ongeveer één uur voor de start van de chemotherapie medicatie moeten innemen. Deze medicatie kan soms obstipatie (harde en moeilijke stoelgang) veroorzaken. Hiervoor neemt u best een laxatief zoals bv. Movicol (siroop of 1 tot 3 zakjes per dag op te lossen in en glas water).

U zal voor thuis Litan tabletten meekrijgen. U mag bij maaglast of misselijkheid de eerste dagen tot 6 tabletten per dag innemen.

## Taxotère

Taxotère is het eerste chemotherapieproduct dat u zal worden toegediend. Het product is kleurloos, en wordt opgelost in een infuuszakje van 250 ml. Het zal u in een tijdspanne van 1 uur toegediend worden.

Naast de klassieke nevenwerkingen zoals vermoeidheid, eventuele misselijkheid en braken kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal ongemakken.

- **Overgevoeligheidsreacties**

Deze komen meestal voor bij de eerste toediening. U kunt plots zweten, een beklemmend gevoel krijgen of kortademig worden. De verpleegkundige zal daarom ook steeds bij deze eerste toediening in uw buurt aanwezig zijn. Mocht u echter toch even alleen zijn en deze symptomen treden op, aarzel dan niet de verpleegkundige onmiddellijk te contacteren. Om die reden zal u ook steeds voor en na de behandeling een aantal tabletten Medrol moeten innemen (zie verder).

- **Haaruitval**

- **Laag aantal witte bloedcellen met een verhoogde kans op infecties**

U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties en/of koorts. Een laag aantal witte bloedcellen met koorts/infectie, kan op zeer korte tijd zeer ernstige infecties veroorzaken. **Bij koorts en/of een infectie dient u daarom steeds onmiddellijk uw arts te verwittigen of u naar het ziekenhuis te begeven!!**

Er zal u worden gevraagd om steeds op ongeveer de tiende dag een tussentijdse bloedcontrole te plannen bij uw huisarts om de weerslag van de therapie op het bloed te evalueren.

- U zal daags na de therapie een **spritje Lonquex** toegediend krijgen door de huisarts. U krijgt Lonquex mee vanuit het ziekenhuis en moet dit thuis in de koelkast bewaren. Lonquex is een groeifactor voor de witte bloedcellen die zorgt voor een sneller herstel van de lage witte bloedcellen tijdens de chemotherapie. Op die manier wordt de kans op infecties verminderd.

- **Verandering van de nagels**

Deze kunnen zowel ter hoogte van handen als voeten, licht bruin verkleuren of brokkelig worden. U kunt preventief de nagels kort vijlen en een goede, vochtinbrengende crème of olie aanbrengen ter hoogte van de nagel en nagelriem. Vermijd het gebruik van nagellak.

- **Pijnlijke tintelingen aan vingertoppen of voetzolen**

Breng uw arts hiervan steeds op de hoogte, soms zal het nodig zijn om de dosis van het product wat aan te passen. Meestal zijn deze klachten het meest uitgesproken kort na de toediening en verbeteren ze na verloop van tijd.

- **Droge huid**

We raden u aan uw huid, die soms ook wat rood kan zien, regelmatig in te wrijven met een bodylotion.

- **Lichte vochtophoping** (= oedemen)

Ter hoogte van het aangezicht, armen en/of benen: u kunt hier zelf weinig voor doen en deze verdwijnen zeker spontaan na het stoppen van de behandeling.

- **Spier- en gewrichtspijn**

Deze symptomen treden meestal een 3-tal dagen na uw behandeling op en kunnen een aantal dagen duren. U mag hiervoor, indien nodig, steeds een pijnstillers, zoals Dafalgan (paracetamol) innemen. Bij aanhoudende of erge last neemt u best contact op met uw huisarts of behandelende arts.

- **Buikkrampen en diarree.**

Bij aanhoudende of ernstige klachten neemt u het best contact op met uw behandelende arts.

## Vorbereiding

Om al deze mogelijke nevenwerkingen zoveel mogelijk te onderdrukken, neemt u een lage dosis cortisone in voor en na de behandeling.

Medrol 32 mg comprimé :

- Dag **voor** behandeling : 1 om 8 uur – 1 om 18 uur
- Dag **van** behandeling : 1 om 8 uur – 1 om 18 uur
- Dag **na** behandeling: 1 om 8 uur – 1 om 18 uur

Medrol kan gedurende enkele dagen een roodheid en gloeiing in het gelaat veroorzaken en kan soms ook enkele dagen toegenomen zenuwachtigheid en slapeloosheid geven.

## Cyclofosfamide

Dit is een ander chemotherapieproduct dat zal worden toegediend. Het product is kleurloos en het infuuszakje loopt over een tijdspanne van ongeveer 30 minuten.

Het product kan de oorzaak zijn van de volgende nevenwerkingen.

- **Prikkeling van de ogen**  
alsof u zand in de ogen kreeg. U kunt dit bij een volgend bezoek aan uw arts melden die u dan een speciaal soort oogdruppeltjes kan voorschrijven.
- **Prikkeling van het neus- en mondslijmvlies**  
Tijdens de inloop van het product. Dit kunt u melden aan de verpleegkundige, die het infuus iets trager zal laten lopen, waarna het ongemak snel zal verdwijnen.
- **Nageltoxiciteit**  
De nagels kunnen brozer worden en van kleur veranderen. U kunt preventief de nagels kort vijlen en een goede, vochtinbrengende crème of olie aanbrengen ter hoogte van de nagel en nagelriem. Vermijd gebruik van nagellak.
- **Lichte vorm van blaasontsteking**

## Naspoelen

Nadat alle medicatie werd toegediend, zal de verpleegkundige nog een laatste infuuszakje met fysiologisch water aanhangen, met de bedoeling u alle medicatie uit de infuusleiding eveneens toe te dienen. Op die manier zal u de voorgeschreven dosis volledig gekregen hebben.

## Contact

Nog vragen? Neem gerust contact op.  
Zie contactinfo vooraan in uw mapje.