Cisplatinum® en Gemcitabine®

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld. We geven u hier graag meer informatie.
We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Toediening

Deze gecombineerde chemotherapie behandeling met Cisplatinum en Gemcitabine wordt om de 3 tot 4 weken toegediend. Tijdens de eerste week wordt u gedurende 1 nacht opgenomen voor toediening van de beide producten. (In sommige gevallen verloopt dit via het dagziekenhuis waar u dus niet moet blijven overnachten.)

De tweede week krijgt u dan enkel Gemcitabine in het dagziekenhuis, dit duurt ongeveer een halve dag. Nadien volgt een week rust. In die week moet u een bloedcontrole late doen door de huisarts.

Dit schema kan individueel wat worden gewijzigd. Het aantal van dergelijke cycli, is afhankelijk van hoe u op deze medicatie reageert.

Dag 1: opname ziekenhuis 1 nacht
Dag 8: dagopname, halve dag
Dag 15: bloedafname door de huisarts
Dag 21= dag 1

Gemcitabine

Gemcitabine is een van de chemoproducten dat u toegediend krijgt. U krijgt dit product op dag 1 van uw behandeling in combinatie met Cisplatinum. Op de 8° dag van de cyclus krijgt u enkel dit product toegediend.
Het product is kleurloos en het infuuszakje van 250 ml. waarin het product is opgelost, loopt in de ader over ongeveer 30 minuten.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 06/01/2023 0520 5953-NL

Nevenwerkingen

Gemcitabine wordt door de meeste patiënten vrij goed verdragen. Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, verminderde eetlust, en een daling van uw aantal witte bloedcellen, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken.

- Misselijkheid en/of braken na uw behandeling
  U mag dan het antibraakmiddel Litican gebruiken.
- Een laag aantal witte bloedcellen
  U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moet u opletten voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts, en bij een temperatuur van 38 graden Celsius of hoger, moet u de arts hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Ook bij een infectie zoals een verkoudheid,... (met of zonder koorts) moet u altijd onmiddellijk uw arts raadplegen. In de derde week laat u een bloedcontrole doen door uw huisarts om de weerslag van de behandeling op uw bloedwaarden te evalueren.
- Daling van de bloedplaatjes, die instaan voor uw bloedstolling (bv. stelpen van een wonde...)
  Bij verhoogde bloedingsneiging (vbv. moeilijk te stelpen bloedneus, bloedend tandvlees...) moet u steeds zo snel mogelijk uw arts raadplegen om een bloedafname te plannen.
- Bij 1 op de 4 patiënten treden allergische huidreacties op tijdens of na de toediening van Gemcitabine.
  De huiduitslag kan gepaard gaan met jeuk. Deze nevenwerking verdwijnt meestal spontaan.
- Lichte koorts, hoofdpijn, rillingen en spierpijn, alsof u een beginnende griep doormaakt,
  Dit komt voor bij 1 op 5 de patiënten. Deze symptomen treden meestal op de avond van de behandeling. U mag dan gerust Dafalgan gebruiken, maar u meldt dit best bij een volgende raadpleging aan uw arts.
- Vochtophopingen (oedeem)
  Bij ongeveer 1 op de 3 patiënten treden lichte vormen van vochtophopingen op ter hoogte van de handen, voeten en/of aangezicht. Deze klachten moeten doorgaans niet behandeld worden en verdwijnen spontaan na het stoppen van uw behandeling.
- Lichte haaruitval
  Kan ook optreden maar is eerder zeldzaam.

Cisplatinum

Cisplatinum is het andere chemotherapeuticum dat u krijgt, enkel op dag 1 van elke cyclus van uw behandeling. Het product is kleurloos en wordt, afhankelijk van de dosis, toegediend over 1 tot 4 uur.

Nevenwerkingen
Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, eventueel misselijkheid en braken of verminderde eetlust, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken.

- Een laag aantal witte bloedcellen
  U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moet u opletten voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts, en bij een temperatuur van 38 graden Celsius of hoger, moet u de arts hiervan op de hoogte brengen.
- Schadelijk zijn voor de werking van de nieren
  Om die reden krijgt u tijdens deze behandeling veel vocht toegediend via de baxter met als bedoeling de nieren goed te spoelen. U zal dus ook veel moeten plassen tijdens deze behandeling. Ook uw gewicht wordt dagelijks gecontroleerd. Het is uitermate belangrijk dat u geen andere medicatie inneemt die ook een verminderde werking van de nieren kan geven (zoals bijvoorbeeld Voltaren enz). Bespreek daarom steeds iedere verandering van uw thuismedicatie met uw arts, ook als het pijnstillers betreft.
- Soms vermindering van het gehoor
- Tintelingen ter hoogte van handen en voeten veroorzaken.
- Haaruitval (zelden)
- Vermoeidheid

Nabehandeling thuis

Indien uw bloedwaarden niet goed zijn of als de nevenwerkingen te zwaar zijn, kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.
Bij vragen of ongemakken kunt u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in de informatiegids.