Immunotherapie Opdualag (nivolumab en relatlimab)

Beste patiënt

Uw arts heeft u een behandeling voorgesteld met Opdualag. Hier geven we u graag wat meer informatie.
Wij wensen we u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Opdualag is een geneesmiddel tegen kanker dat wordt gebruikt voor het behandelen van gevorderd melanoom.
Opdualag bevat twee werkzame bestanddelen: nivolumab en relatlimab.
Opdualag (nivolumab en relatlimab) is een dubbele immunotherapie combinatiebehandeling van de PD-1-remmer nivolumab (ook bekend als Opdivo) en het nieuwe LAG-3-blokkerend antilichaam relatlimab.

Hoe wordt Opdualag toegediend?

Opdualag wordt steeds om de 4 weken toegediend in het dagziekenhuis met een infuus (baxter). Eens de behandeling werd opgestart, krijgt u deze behandeling zolang de ziekte onder controle blijft en u geen last hebt van ernstige bijwerkingen. De inlooptijd van Opdualag bedraagt ongeveer 30 minuten. Reken erop dat u voor het volledige verloop een voor- of namiddag kan doorbrengen in het ziekenhuis.

Nevenwerkingen

Soms activeert de behandeling het afweersysteem zodanig dat het niet alleen de kankercellen, maar ook eigen, gezonde cellen aanvalt. Dit kan zich ook uiten onder de vorm van klachten die onschuldig lijken zoals jeuk, buikpijn en diarree. Het is dan ook erg belangrijk uw klachten tijdig te melden.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 16/10/2025 0520 6448-NL

Symptomen kunnen op ieder moment optreden tijdens de behandeling en soms zelfs maanden na het stoppen van de behandeling. Regelmatig gebeurt ook een bloedafname, onder andere om deze bijwerking op te sporen. Soms is het door deze nevenwerking noodzakelijk om de behandeling te stoppen.

De belangrijkste symptomen van immuungerelateerde bijwerkingen:

- Problemen met uw **longen**, zoals ademhalingsproblemen of hoesten. Dit kunnen verschijnselen zijn van ontsteking van de longen.
- **Diarree** (waterige, dunne of zachte ontlasting) of symptomen van ontsteking van de darmen zoals buikpijn en slijm of bloed in de ontlasting.
- Ontsteking van de **lever**. Klachten of symptomen van hepatitis zijn bijvoorbeeld afwijkingen in leverfunctietesten (bloedafname) of de huid of ogen die geel worden.
- Ontsteking of problemen met uw **nieren**. Klachten zijn bijvoorbeeld afwijkingen in nierfunctietesten (bloedafname) of minder urine produceren.
- Problemen met uw **hormoonproducerende klieren** (waaronder de hypofyse, schildklier en de bijnieren). Klachten zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, gewichtsverandering of hoofdpijn en verstoord gezichtsvermogen.
- **Diabetes** (suikerziekte). Symptomen hiervan zijn buitensporige dorst, toename van eetlust met vermindering van gewicht, vermoeidheid, sufheid.
- Ontsteking van de **huid** die uitslag en jeuk kan veroorzaken.

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw waarden van uw bloedafname niet goed zijn of als uw nevenwerkingen te zwaar zijn, kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.

Bij vragen of ongemakken kan u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in deze infomap.