Carboplatinum - Paclitaxel (taxol)

3-wekelijks

Beste patiënt(e)

Je arts heeft jou deze behandeling voorgesteld, we geven je hier graag meer uitleg. We wensen je veel succes en moed toe met je behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Carboplatinum-Paclitaxel ?

- Beide zijn verschillende soorten chemo die de celdeling remmen.
- Ze hebben als doel de kankercellen te bestrijden.

Hoe wordt het toegediend ?

- Chemo dienen we via een infuus in de arm of via PAC, PICC toe.
- Deze kuur van 2 producten (Carboplatinum en Paclitaxel) dienen we toe in het **oncologisch dagziekenhuis**.
- Carboplatinum loopt over 1 uur en Paclitaxel over 1 uur.
- Voorafgaand aan de Carboplatinum en Paclitaxel en ook nadien dienen we extra **vocht** toe.
- Je zal ook 2 medicamenten tegen de **misselijkheid** mogen innemen (Akynzeo en Dexamethasone 12mg).
- Beide chemo's dienen we via een **pomp** toe.
- **Om de 3 weken** krijg je een kuur.
- De duur hangt af van hoe de kanker reageert, en of je niet te veel last hebt van de bijwerkingen.
- Meestal varieert dit tussen de 4 tot 6 kuren.

azdelta

Deze brochure is laatst aangepast op 13/03/2026 0520 5374-NL

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen ?

- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Vermoeidheid
- Misselijkheid en braken
- Volledige haaruitval (begint na 3-tal weken)
- Koorts boven de 38,5 graden (teken van infectie)
- Verminderde eetlust en smaakverandering
- Pijnlijke mond (aften of ontsteking mondslijmvlies)
- Verstopping of diarree
- Tintelingen in handen of voeten (zenuwpijnen)
- Overgevoeligheidsreacties tijdens inlopen Paclitaxel (kortademigheid, druk op de borstkas, lage bloeddruk, huidreactie)

Nabehandeling thuis en praktische info

- In principe mag je alles **eten en drinken**, zelfs een glaasje alcohol mag, maar met mate.
- Blootstelling aan de **zon** raden we af. We raden aan zonneproducten met hoge beschermingsfactor (50+) te gebruiken, en ook een hoofddeksel op te zetten.
- Om blootstelling aan chemotherapie te voorkomen bij **seks**, is het belangrijk tot 7 dagen na de chemotherapietoediening een voorbehoedsmiddel te gebruiken en het is raadzaam om dit ook achteraf verder te gebruiken.
- Bij je **vertrek** uit het ziekenhuis geven we je de volgende afspraak mee en een overzicht van de nog te nemen **medicatie**.
- Afhankelijk van je bloedresultaten en algemene toestand, bestaat de kans dat je behandeling een paar dagen wordt uitgesteld of dat het noodzakelijk is de dosis aan te passen.
- Medicatie tegen **misselijkheid** krijg je mee samen met het innameschema.
- De avond vóór de chemotoediening moet je een comprimé **Dexamethasone van 20 mg innemen**. Je krijgt deze mee en het is van belang dat je deze zeker inneemt om reactie op de chemo te voorkomen!
- Normaal wordt er na 2 volledige cycli een **CT thorax** gepland.
- Vóór elke toediening gebeurt er ook steeds een bloedafname in het ziekenhuis of via de huisarts.
- Mannelijke patiënten raden we aan **zittend te plassen**.

- Na elke toiletbeurt doe je het toiletdeksel dicht en spoel je 2 maal door.
- Goede opvolging van het **stoelgangpatroon** is nodig omdat sommige medicamenten constipatie veroorzaken.
- De **verpleegkundig consulent** zal je verder begeleiden in het verloop van je behandeling.
- De sociaal assistente zal bij opstart van je therapie langskomen, om info te geven over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz.
- De diëtist zal ook bij je langskomen bij opstart en tijdens je behandelingen: zij geeft tips en voedingsadvies.
- **Goede opvolging van je temperatuur is héél belangrijk!**
- Bij een verhoging boven de 38 graden contacteer je steeds je huisarts of het ziekenhuis.
- Nauwkeurige beschrijving en nuttige tips over de bijwerkingen zijn terug te vinden in het infomapje.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid: aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in het infomapje).