

Chemotherapie Carboplatinum - paclitaxel (Taxol) wekelijks

Beste patiënt

Uw arts heeft volgende behandeling voorgesteld. In deze folder geven we graag wat meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Carboplatinum-Paclitaxel ?

- Beide zijn verschillende soorten chemo die op hun manier de celdeling remmen.
- Ze hebben als doel de kankercellen te bestrijden.

Hoe wordt het toegediend ?

- De chemo wordt via een infuus in de arm of via PAC, PICC toegediend.
- Deze kuur van 2 producten(Carboplatinum en Paclitaxel) wordt toegediend in het oncologisch dagziekenhuis.
- Carboplatinum loopt over 1 uur, en Paclitaxel over 1 uur.
- Voorafgaand de Carboplatinum, Paclitaxel en ook nadien wordt er extra vocht toegediend.
- U mag ook 2 geneesmiddelen tegen misselijkheid innemen (Akynzeo en Dexamethasone 12 mg).
- Beide chemo's worden via een pomp toegediend.
- De 1ste week krijgt u 2 chemoprodukten, de 2e en 3e week is het enkel Paclitaxel.
- De 4 de week is een rustweek en dan herhaalt de cyclus opnieuw.
- De duur hangt af van hoe de kanker reageert, en of u niet te veel last heeft van de bijwerkingen.
- Meestal varieert dit tussen de 4 tot 6 kuren.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen ?

- Invloed op de bloedcellen (rode, witte bloedcellen en bloedplaatjes)
- Vermoeidheid
- Misselijkheid en braken
- Volledige haaruitval (begint na 3-tal weken)
- Koorts temperatuur van meer dan 38,5 graden (teken van infectie)
- Verminderde eetlust en smaakverandering
- Pijnlijke mond (aftan of ontsteking mondslijmvlies)
- Verstopping / diarree
- Tintelingen in handen / voeten (zenuwpijn)
- Overgevoeligheidsreacties tijdens inlopen Paclitaxel (kortademigheid, druk op de borstkas, lage bloeddruk, huidreactie)

Nabehandeling thuis en praktische info

- In principe mag u alles eten en drinken, zelfs glaasje alcohol mag maar met mate.
- Blootstelling aan de zon wordt afgeraden, we adviseren gebruik te maken van zonneproducten met hoge beschermingsfactor (50+) en ook een hoofddekseel te dragen.
- Om blootstelling aan chemotherapie te voorkomen bij seksueel verkeer, is het belangrijk tot 7 dagen na chemotherapie een voorbehoedsmiddel te gebruiken en het is zelfs raadzaam om dit ook achteraf verder te gebruiken.
- Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u een afspraak mee voor een raadpleging en ook een overzicht van de nog te nemen medicatie.
- Afhankelijk van uw bloedresultaten / uw algemene toestand, bestaat de kans dat uw behandeling voor paar dagen wordt uitgesteld of dat er een dosis aanpassing noodzakelijk is.
- Medicatie tegen misselijkheid krijgt u ook mee samen met het innameschema.
- De avond vóór de chemotoediening neemt u een tablet Dexamethasone van 20 mg in, de volgende weken is dit een dosis van 8 mg. U krijgt deze mee en is van belang dat u deze zeker inneemt om reactie op de chemo te voorkomen!!!
- Gewoonlijk wordt er na 2 volledige cycli een CT Thorax gepland.
- Vóór elke toediening is er steeds een bloedafname gepland hier in het ziekenhuis of via uw huisarts.

- Mannelijke patiënten raden we steeds aan zittend te plassen.
- Na elke toiletbeurt moet u het toiletdeksel sluiten en 2 keer spoelen.
- Een goede opvolging van het stoelgangspatroon is nodig omdat sommige medicamenten opstoppend werken.
- De verpleegkundig consulent begeleidt u in het verloop van de behandeling.
- De sociaal assistente komt langs bij de opstart van de therapie om info te verschaffen over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz...
- De diëtiste komt ook langs bij de opstart en tijdens de behandeling, zij geeft tips en voedingsadviezen.
- **Een goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!**
Bij een verhoging boven de 38 graden neemt u steeds contact op met uw huisarts of het ziekenhuis.
- Een nauwkeurige beschrijving en nuttige tips in kader van de bijwerkingen zijn terug te vinden in de informatiegids.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in de informatiegids)