

Carboplatinum-Taxotere (Docetaxel) 3-wekelijks

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Carboplatinum-Taxotere?

- Beide zijn verschillende soorten chemo die op hun manier de celdeling remmen.
- Ze hebben als doel de kankercellen te bestrijden.
- Het bevat het celremmend geneesmiddel Docetaxel.
- Voor patiënten met een longkanker

Hoe werkt Carboplatinum-Taxotere?

Taxanen zoals docetaxel verstoren de celstructuur waardoor celdeling niet meer goed plaatsvindt.

In elke cel bevinden zich kleine buisvormige structuren. Deze buisjes maken deel uit van het 'geraamte' van de cel en zijn belangrijk bij de celdeling.

Docetaxel verstoort de aanmaak van buisvormige structuren door enerzijds de aanmaak ervan aan te wakkeren, en anderzijds te verhinderen dat bestaande structuren worden afgebroken.

Hierdoor verstikt de cel als het ware en kan hij zich niet meer delen.

Waar en hoe wordt Carboplatinum-Taxotere toegediend?

- De therapie gebeurt in het oncologisch dagziekenhuis.
- U moet niet nuchter binnenkomen tenzij anders werd gevraagd.
- U krijgt normaal om de 3 weken therapie.
- Meestal zijn het 4 tot 6 cycli (afhankelijk van het resultaat en hoe goed u de behandeling verdraagt).
- Het product wordt via een infuus toegediend langs een ader of via een poortcatheter/PICC.
- Aangezien de therapie broosheid en afbrokkelen van nagels kan veroorzaken is het belangrijk uw nagels en nagelriem vooraf goed in te smeren met een hydraterende crème.
- Belangrijk is dat u vooraf uw medicatie hebt ingenomen: 1 Medrol 32 mg daags voordien bij het ontbijt en avondmaal alsook de ochtend van de opstart van de therapie !!
- Voor de eigenlijke toediening van de chemo krijgt u medicatie om misselijkheid te voorkomen. (Akynteo)
- Vooraf en achter de therapie wordt er een spoelinfaus toegediend.
- De eigenlijke therapie wordt via een chemopomp toegediend (zodat juiste dosis over juiste tijdspanne inloopt): Carboplatinum/ 1 uur en Taxotère / 1 uur
- Vóór elke toediening van een nieuw product vraagt de verpleegkundige naar uw naam en geboortedatum.
- De verpleegkundige controleert ook de terugvloeï van bloed in uw infuusleiding.
- Bij elke manipulatie van de chemo draagt de verpleegkundige handschoenen uit veiligheidsoverwegingen.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- Vermoeidheid
- Misselijkheid / braken
- Vochtophopping in de weefsels (zwellen handen, voeten, benen...)
- Volledige haaruitval (start ongeveer 3 weken na toediening)
- Ontsteking van mondslijmvlies (blaasjes in mond, aften)
- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Nagelaandoeningen (verkleuring)
- Diarree / obstipatie
- Huidaandoeningen (roodheid, droogte en eventueel vervelling)

- Overgevoeligheidsreacties tijdens inlopen product (beklemmend gevoel op de borst, griepsyndroom, jeuk, ademnood)
- Spierpijn en zwakte
- Tranende en geïrriteerde ogen

Nabehandeling thuis en praktische info

- Vanavond, morgenvroeg en morgenavond neemt u nog een Medrol van 32 mg in.
- U krijgt in totaal 6 comprimés mee: 3 voor de huidige therapie en 3 als voorbereiding voor de volgende therapie.
- Blootstelling aan de zon wordt afgeraden, we adviseren gebruik te maken van zonneproducten met hoge beschermingsfactor (50+) en ook een hoofddekseel te dragen.
- Om blootstelling aan chemotherapie te voorkomen bij seksueel verkeer, is het belangrijk tot 7 dagen na de toediening van de chemotherapie een voorbehoedsmiddel te gebruiken.
- Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u een volgende afspraak mee en ook een overzicht van de nog te nemen medicatie.
- Afhankelijk van uw bloedresultaten / uw algemene toestand, bestaat de kans dat uw behandeling voor paar dagen wordt uitgesteld of dat er een aanpassing van de dosis nodig is.
- Medicatie tegen misselijkheid krijgt u mee samen met het innameschema(Litican).
- Normaal wordt er na 2 volledige cycli een CT thorax gepland.
- Vóór elke toediening gebeurt er steeds een bloedafname in het ziekenhuis of via huisarts op dag 8 en dag 15
- Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
- Na elke toiletbeurt doet u het toiletdekseel dicht en spoelt u 2 keer door.
- Goede opvolging van het stoelgangspatroon is nodig omdat sommige medicamenten opstoppend werken
- De verpleegkundig consulent begeleidt u in het verder verloop van de behandeling
- De sociaal assistente komt langs bij de opstart van de therapie om info te verschaffen over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz...
- De diëtiste komt langs bij de opstart en tijdens de behandelingen, zij geeft tips en voedingsadviezen.
- **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!**

- Bij een verhoging boven de 38 graden neemt u steeds contact op met uw huisarts of met uw arts in het ziekenhuis.
- Nauwkeurige beschrijving en nuttige tips in kader van de bijwerkingen vindt u in uw infomapje.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in uw infomapje)