Carboplatinum-Taxotere (Docetaxel) 3-wekelijks

Beste patiënt(e)

In deze brochure geven we graag meer informatie over de behandeling die je arts heeft voorgesteld: Carboplatinum-Taxotere 3-wekelijks.
We wensen je veel succes en moed toe en staan voor je klaar tijdens je behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Carboplatinum-Taxotere?

- Beide medicijnen zijn verschillende soorten chemo om kankercellen te bestrijden. Ze bevatten allebei het celremmend geneesmiddel Docetaxel.
- Deze chemotherapie wordt gebruikt bij patiënten met een longkanker.

Hoe werkt Carboplatinum-Taxotere?

In elke cel bevinden zich kleine buisvormige structuren. Deze buisjes maken deel uit van het 'geraamte' van de cel en zijn belangrijk bij de celdeling.

Docetaxel verstoort de aanmaak van die buisvormige structuren door enerzijds de aanmaak ervan aan te wakkeren, en anderzijds te verhinderen dat bestaande structuren worden afgebroken. Hierdoor kunnen kankercellen niet verder delen en sterven ze af.

azdelta

Deze brochure is laatst aangepast op 19/10/2026 0520 6393-NL

Waar en hoe wordt Carboplatinum-Taxotere toegediend?

- De therapie gebeurt in het **oncologisch dagziekenhuis**.
- Je hoeft niet nuchter te zijn, tenzij dit expliciet wordt gevraagd.
- Normaalgezien krijg je de behandeling om de **3 weken**.
- De behandeling bestaat meestal uit 4 tot 6 cyclussen, afhankelijk van het resultaat en hoe goed je de behandeling verdraagt.
- Je krijgt de therapie via een infuus in een ader of via een poortcatheter/ PICC.
- De therapie kan je nagels broos maken en ervoor zorgen dat ze afbrokkelen. Daarom is het belangrijk om je nagels en nagelriem voor de behandeling goed in te smeren met een hydraterende crème.
- Neem 1 Medrol 32 mg vóór je therapie:
  - de dag voor je therapie bij het ontbijt en avondmaal
  - de ochtend van de opstart van je therapie
- Voor we de behandeling starten, krijg je medicatie (Akynzeo) om misselijkheid te voorkomen.
- Je krijgt de chemobehandeling via een chemopomp. zodat de juiste dosis over de juiste tijdspanne kan toegediend worden: Carboplatinum 1 uur en Taxotere 1 uur
- Voor en na de therapie krijg je een spoelinfuus.
- Vóór het toedienen van een nieuw product vraagt de verpleegkundige telkens je naam en geboortedatum.
- De verpleegkundige controleert ook de terugvloei van bloed in je infuusleiding.
- Bij elke aanraking met de chemomedicatie draagt de verpleegkundige handschoenen uit veiligheid.

Wat zijn mogelijke nevenwerkingen?

- Vermoeidheid
- Misselijkheid/braken
- Vochtophoping die zorgt voor gezwollen handen, voeten, benen...
- Volledige haaruitval (start ongeveer 3 weken na de chemo)
- Blaasjes in je mond of aften door ontsteking van het mondslijmvlies
- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Nagelaandoeningen (verkleuring)
- Diarree/verstopping (obstipatie)
- Huidaandoeningen (roodheid, droogte en eventueel vervelling)
- Overgevoeligheidsreacties wanneer je de chemo krijgt (beklemmend gevoel op de borst, griepsyndroom, jeuk, ademnood)
- Spierpijn en een zwak gevoel
- Tranende en geïrriteerde ogen

Nabehandeling thuis en praktische info

- Neem vanavond, morgenvroeg en morgenavond nog een **Medrol** van 32 mg. je krijgt in totaal 6 pillen mee: 3 voor de huidige therapie en 3 als voorbereiding voor de volgende therapie.
- Een inspuiting met **Lonquex**, 24 uur na je chemo, door een thuisverpleegkundige. Je krijgt dit spuitje mee vanuit het ziekenhuis.
- We geven je medicatie tegen misselijkheid (**Litican**) mee, samen met het innameschema.

- Vermijd blootstelling aan de **zon**, gebruik zonneproducten met een hoge beschermingsfactor (50+) en draag een hoofddeksel.
- Resten van de chemotherapie kunnen nog enkele dagen aanwezig zijn in je lichaam. Gebruik daarom tot 7 dagen na je therapie een **voorbehoedsmiddel** bij seksueel contact.
- Doe het **toilet**deksel dicht na elke toiletbeurt en spoel 2 keer door. Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
- Volg je **stoelgang** goed op, sommige medicatie kan zorgen voor obstipatie.
- Controleer regelmatig **je lichaamstemperatuur.** Neem bij een verhoging boven de 38 graden altijd contact op met je huisarts of specialist.

- De **verpleegkundig consulent** begeleidt je tijdens je behandeling.
- De **sociaal assistente** komt langs bij de opstart van de therapie om info te geven over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz...
- De **diëtiste** geeft tips en voedingsadviezen bij je therapie.

- Afhankelijk van je bloedresultaten en je algemene gezondheidstoestand, is het mogelijk dat de behandeling voor paar dagen wordt uitgesteld of dat er een aanpassing van de dosis nodig is.
- Meestal plannen we na 2 volledige therapieën een CT van je borst.
- Vóór elke chemotherapie moet er bloed afgenomen worden in het ziekenhuis of via je huisarts op dag 8 en dag 15.
- Bij je vertrek uit het ziekenhuis leggen we een volgende afspraak vast en geven we een overzicht van de nog te nemen medicatie mee.

- In je **infomapje** vind je
  - een nauwkeurige beschrijving en nuttige tips over mogelijke bijwerkingen.
  - een telefoonlijst. Aarzel niet om ons te contacteren als je vragen hebt, problemen ondervindt of ongerust bent!