Chemotherapie Cisplatinum-Taxotere (Docetaxel) 3-wekelijks

Beste patiënt(e)

Je arts heeft je deze behandeling voorgesteld, we geven je hier graag meer uitleg over. We wensen je veel succes en moed toe met je behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Cisplatinum-Taxotere?

- Beiden zijn verschillende soorten chemo die de celdeling remmen.
- Ze hebben als doel de kankercellen te bestrijden.
- Het bevat het celremmend geneesmiddel Docetaxel.
- Voor patiënten met een longkanker.

Hoe werkt Cisplatinum-Taxotere?

Taxanen zoals Docetaxel **verstoren de celstructuur** waardoor celdeling niet meer goed plaatsvindt. In elke cel bevinden zich kleine buisvormige structuren. Die buisjes maken deel uit van het 'geraamte' van de cel en zijn belangrijk bij de celdeling.

Docetaxel verstoort de aanmaak van buisvormige structuren door enerzijds de aanmaak ervan aan te wakkeren, en anderzijds te verhinderen dat bestaande structuren worden afgebroken.
Hierdoor verstikt de cel als het ware en kan hij zich niet meer delen.

Waar en hoe wordt Cisplatinum-Taxotere toegediend?

- De therapie gebeurt in de oncologische **verpleegafdeling**.
- Je moet niet nuchter binnenkomen tenzij anders gevraagd.
- Je krijgt normaal **om de 3 weken** therapie.
- Meestal zijn het 4 tot 6 cycli (afhankelijk van resultaat en hoe goed je de behandeling verdraagt).
- We dienen het product toe via een infuus langs een ader of via een poortkatheter/ PICC.

azdelta

Deze brochure is laatst aangepast op 13/03/2026 0520 6397-NL

- Aangezien de therapie broosheid en afbrokkelen van nagels kan veroorzaken, is het belangrijk je **nagels en nagelriem** vooraf goed in te smeren met een hydraterende crème.
- **Belangrijk is dat je vooraf je medicatie hebt ingenomen:** 1 tablet Medrol 32 mg daags voordien bij het ontbijt en avondmaal alsook de ochtend van de opstart van de therapie.
- Voor de eigenlijke toediening van de chemotherapie krijg je medicatie om **misselijkheid** te voorkomen. (Akynzeo)
- Voor en na de therapie dienen we een **spoelinfuus** toe.
- De eigenlijke therapie dienen we via een **chemopomp** toe, zodat juiste dosis over juiste tijdspanne inloopt: Cisplatinum/4 uur en Taxotère/1 uur.
- Vóór elke toediening van een nieuw product vraagt de verpleegkundige naar je naam en geboortedatum.
- De verpleegkundige controleert ook de terugvloei van bloed in je infuusleiding.
- Bij elke manipulatie van de chemotherapie draagt de verpleegkundige handschoenen uit veiligheidsoverwegingen.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- Vermoeidheid
- Misselijkheid of braken
- Vochtophoping in de weefsels (zwelling handen, voeten, benen ...)
- Volledige haaruitval (start ongeveer 3 weken na toediening)
- Ontsteking van mondslijmvlies (blaasjes in mond, aften)
- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Nagelaandoeningen (verkleuring)
- Diarree / obstipatie
- Huidaandoeningen (roodheid, droogte en eventueel vervelling)
- Overgevoeligheidsreacties tijdens inlopen product (beklemmend gevoel op de borst, griepsyndroom, jeuk, ademnood)
- Spierpijn en zwakte
- Tranende en geïrriteerde ogen

Nabehandeling thuis en praktische info

- De avond van de behandeling, de ochtend nadien en de avond nadien neem je nog een tablet **Medrol** van 32 mg in.
- Je krijgt 6 tabletten Medrol mee: 3 voor de huidige therapie en 3 als voorbereiding op de volgende therapie.
- We raden je aan **zonneproducten** met hoge beschermingsfactor (50+) te gebruiken en ook een hoofddeksel te dragen.
- Om blootstelling aan chemotherapie te voorkomen bij **seks**, is het belangrijk tot 7 dagen na de toediening van de chemotherapie een voorbehoedsmiddel te gebruiken en blijft het raadzaam om dit daarna ook verder te gebruiken.
- Bij je **vertrek uit het ziekenhuis** krijg je een volgende afspraak mee en ook een overzicht van de nog te nemen medicatie.
- Door je **bloedresultaten** en algemene **toestand**, kunnen we beslissen je behandeling een paar dagen uit te stellen of de dosis aan te passen.
- Medicatie tegen **misselijkheid** krijg je mee samen met het innameschema (Litican).
- Normaal wordt er na 2 volledige cycli een **CT Thorax** gepland.
- Vóór elke toediening gebeurt er steeds een bloedafname in het ziekenhuis of via de huisarts op dag 8 en dag 15.
- Mannelijke patiënten raden we aan **zittend te plassen**.
- Na elke toiletbeurt doe je het toiletdeksel dicht en spoel je 2 keer door.
- Goede opvolging van het stoelgangspatroon is nodig omdat sommige medicamenten opstoppend werken.
- De verpleegkundig consulent begeleidt je in het verloop van de behandeling.
- De sociaal assistent komt langs bij de opstart van de therapie om info te verschaffen over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz.
- De diëtist komt langs bij de opstart en tijdens de behandelingen: zij geeft tips en voedingsadvies.
- **Een goede opvolging van je temperatuur is héél belangrijk!**
  Bij een verhoging boven de 38 graden neem je contact op met je huisarts of met je arts in het ziekenhuis.
- Een nauwkeurige beschrijving en nuttige tips over de bijwerkingen vind je in je infomapje.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid: contacteer ons gerust (zie telefoonlijst in je infomapje).