Chemotherapie BEP

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld. We geven hier graag wat meer informatie en wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Verloop therapie

De gecombineerde chemotherapiebehandeling met Cisplatinum en Etoposide krijgt u 5 dagen na elkaar toegediend. Daarnaast krijgt u wekelijks nog een derde cytostaticum (Bleomycine), in het dagziekenhuis in de 2de en 3de week). Dit gecombineerd schema wordt in principe om de 3 weken herhaald.

De eerste week wordt u gedurende 5 dagen opgenomen in het ziekenhuis. De tweede en derde week verblijft u telkens ongeveer een halve dag in het dagziekenhuis voor de toediening van Bleomycine.
Uw 3-wekelijks schema ziet er samengevat als volgt uit:

- Week 1 tem dag 5: opname in het ziekenhuis
- Week 2: halve dag op het dagziekenhuis
- Week 3: halve dag op het dagziekenhuis
- Week 4 = dag 1, start volgende cyclus

Toediening

Uw behandeling start met het toedienen van 1 liter vocht over een tijdspanne van 4 uur.
De chemotherapie Cisplatinum kan schadelijk zijn voor de werking van uw nieren. Hiervoor is het noodzakelijk dat u veel vocht via uw aders toegediend krijgt. Daarnaast is het ook aan te bevelen dat u veel drinkt.
Op die manier zullen uw nieren extra gestimuleerd worden en zo beschermd.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 04/01/2023 0520 6000-NL

Nevenwerkingen

Cisplatinum is een chemotherapeuticum dat u gedurende de 5 dagen opname krijgt. Het product is kleurloos en wordt in een infuus van 1 liter over ongeveer 4 uur worden toegediend.

Naast de klassieke nevenwerkingen van een chemotherapiebehandeling zoals moeheid en misselijkheid, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken.

- Een verminderde goede werking van uw nieren is één van de belangrijkste nevenwerkingen van het product. Bij elke bloedafname worden uw nieren gecontroleerd. Dit geeft de arts een duidelijk beeld van hoe uw nieren functioneren en laten toe om zo nodig uw dosis aan te passen. Omwille van het efffect op de nieren krijgt gedurende de hele week veel vocht worden toegediend via het infuus. Sommige andere medicatie kan ook een vermindering van de nierwerking veroorzaken. Bespreek daarom steeds alle medicatie die u inneemt met uw arts.
- Tijdens de opname wordt uw gewicht dagelijks gecontroleerd en krijgt u, indien nodig, een waterafdrijvend medicijn via het infuus toegediend.
- Een vermindering van uw gehoor voor hoge tonen of oorsuizen komt ook vrij regelmatig voor. Het vermogen om een normaal gesprek te horen is soms gestoord. Wanneer u hiervan last krijgt, meldt u dit dan zeker aan uw arts. Deze nevenwerking herstelt zich meestal een tijdje na het beëindigen van de behandeling.
- Een daling van uw aantal witte bloedcellen komt vrij regelmatig voor. U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moet u opletten voor mogelijke infecties. Controleer daarom regelmatig uw koorts, en bij een temperatuur van 38 gradne Celsius of hoger, moet u uw arts op de hoogte brengen. Ook bij een infectie bv. een verkoudheid (met of zonder koorts) moet u onmiddellijk uw arts raadplegen. Wekelijks is er een bloedafname om de weerslag van de therapie op de bloedcellen te evalueren.
- Daags na de eerste week chemotherapie krijgt u een spuit **Lonquex** toegediend. Dit spuitje verkort de periode van lage witte bloedcellen en vermindert op die manier de kans op infecties. Lonquex kan soms gedurende maximaal enkele dagen pijn geven ter hoogte van de lage rug of het borstbeen. U kunt hiervoor steeds een pijnstiller innemen zoals Dafalgan (paracetamol).
- Vermoeidheid

Etoposide, ook wel vepesid of VP-16 genaamd, krijgt u toegediend tijdens opname. Het product wordt opgelost in een infuuszakje van 500 milliliter en loopt in over ongeveer 30 minuten.

Naast de klassieke nevenwerkingen van een chemotherapiebehandeling zoals moeheid, misselijkheid en braken, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken.

- Haaruitval komt bij 2 op de 3 patiënten voor. Na het stoppen van de behandeling, groeit uw haar volledig terug.
- Een ontsteking van uw mondslijmvlies ongeveer 5 tot 10 dagen na de behandeling kan eveneens voorkomen. Een heel goede mondhygiëne is zeker aan te raden. Poets geregeld uw tanden met een zachte tandenborstel en probeer irriterende spijzen te vermijden. Mocht u ondanks een goede preventie, hier toch last van hebben, dan moet u dit zeker melden aan de arts, die u een mondspoelmiddel zal voorschrijven.
- Etoposide kan bij sommige patiënten een slechte smaak in de mond geven.

Bleomycine is het derde chemotherapeuticum uit deze behandeling. U krijgt het tijdens uw opnameweek op de tweede dag. Dit product wordt ook nog 1 maal tijdens de tweede en derde week via het dagziekenhuis toegediend.

Naast de klassieke nevenwerkingen van een chemotherapie behandeling kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken.

- Koorts 4 tot 10 uur na de toediening van het product is de belangrijkste nevenwerking. Soms kan de koorts gepaard gaan met rillingen. U mag hiervoor een koortsremmer zoals bv. Dafalgan innemen.
- Een ontsteking van uw mondslijmvlies
- In zeldzame gevallen een verminderde werking van de longen. Op geregelde tijdstippen tijdens de behandeling kan een blaastest van de longen worden uitgevoerd. Er wordt ten stelligste aangeraden om te stoppen met roken tijdens en ook na deze behandeling.

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw bloedwaarden niet goed zijn of als uw nevenwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.

Bij vragen of ongemakken kunt u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in deze infogids.