Chemotherapie Cabazitaxel (Jevtana®)

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld. Hier geven we u graag wat meer uitleg.
We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Toediening

De chemotherapie, zal u op één bepaalde dag toegediend worden, telkens gevolgd door 3 weken rust.
Deze behandeling bestaat uit een bloedafname, een raadpleging bij uw behandelende arts en de toediening van de medicatie in het dagziekenhuis oncologie en zal ongeveer een halve dag duren.

Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u zal krijgen, met hun eventuele mogelijke nevenwerkingen. Alle medicatie wordt in afzonderlijke infuuszakjes klaargemaakt en via een infuusleiding in een bloedvat ingebracht.

Jevtana

Jevtana is het chemotherapeuticum dat u zal toegediend worden. Het product is opgelost in een baxter van 250 ml en loopt via uw infuus in wat ongeveer 1 uur duurt.

U zal gedurende de behandeling met Jevtana dagelijks een lage dosis cortisone in pilvorm moeten bijnemen, medrol 8 mg (een vierde van een medrol van 32 mg) Uw arts zal dit voorschrijven bij de start van de behandeling.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 27/02/2024 0520 5939-NL

Bijwerkingen

Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, eventuele misselijkheid en braken kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal ongemakken.

- **Haaruitval**
  wordt zeer zelden waargenomen.
- **Laag aantal witte bloedcellen met een verhoogde kans op infecties**.
  U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties en/of koorts. Een laag aantal witte bloedcellen met koorts/infectie, kan op zeer korte tijd zeer ernstige infecties veroorzaken. Bij koorts en/of een infectie, moet u daarom steeds onmiddellijk uw arts verwittigen of naar het ziekenhuis komen!
  We vragen u om steeds op ongeveer de tiende dag een tussentijdse bloedcontrole te plannen bij uw huisarts om de weerslag van de therapie op het bloed te evalueren.
- **Buikkrampen en diarree**
  U mag bij diarree steeds Imodium innemen (tot 4/dag). Als de diarree echter langer aanhoudt dan 24 uur of bij ernstige klachten, verwittigt u onmiddellijk uw arts. In sommige gevallen kan een opname noodzakelijk zijn om uitdroging door diarree te voorkomen.
- **Spierzwakte en rugpijn**
  Soms kunnen zinderingen of tintelingen ontstaan in de vingertoppen/voetzolen.
- **Afwijkingen van de leverwaarden in het bloed**

Wat mag u niet doen?

- U mag tijdens deze behandeling geen pompelmoes eten of pompelmoessap drinken. Dit kan een invloed hebben op de werking van het medicijn.
- Vermijd sint-janskruid en Echinacea.
- Bespreek altijd al uw andere medicatie samen met uw behandelend arts. Sommige medicijnen kunnen de werking van de chemotherapie beïnvloeden. Start daarom nooit zelf nieuwe medicatie zonder dit met uw behandelend arts te bespreken.

Naspoelen

Nadat de medicatie werd toegediend, zal de verpleegkundige nog een laatste infuuszakje met fysiologisch water aanhangen, met de bedoeling naast het voorkomen van irritatie van uw bloedvaten, u alle medicatie uit de infuusleiding eveneens toe te dienen. Op die manier zal u de voorgeschreven dosis volledig gekregen hebben.

Nabehandeling thuis en praktische info

Indien uw labwaarden niet goed zijn of als uw nevenwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.

Bij vragen of ongemakken kan u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in deze infomap.