

Carboplatinum-5FU

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende behandeling voorgesteld. We geven u hier graag meer informatie.

We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Toediening

De hierna volgende gecombineerde chemotherapie-behandeling met Carboplatinum en 5FU (Fluoro-uracil) zal u om de 3 tot 4 weken toegediend worden. U moet voor deze behandeling 4 dagen worden opgenomen.

In principe zal deze chemotherapie cyclus 4 maal herhaald worden, maar het is afhankelijk van hoe uw ziekte op deze medicatie reageert.

5-Fluoro Uracil

Dit product is een van de chemotherapie producten die u zal krijgen. Het product zal u gedurende de verschillende dagen opname worden toegediend. Het wordt opgelost in een baxter van 1 liter die telkens over ongeveer 24 uur zal inlopen.

Mogelijke nevenwerkingen

- **Diarree**

U mag hiervoor steeds Imodium innemen. Wanneer de diarree uitgesproken is of langer dan 24 uur aanhoudt, dan verwittigt u hiervan best onmiddellijk uw verpleegkundig specialist of arts.

- **Mondslimvliesontsteking**

Een goede mondhygiëne is aan te raden (meermaals per dag tanden poetsen met een zachte tandenborstel). Ook het gebruik van sterk irriterende spijzen zoals kruiden, mosterd... zijn dan beter te vermijden. U mag ook steeds



een mondspoelmiddel zoals Perio-Aid verschillende maal per dag gebruiken. Mocht u toch nog klachten hebben, verwittig dan zo snel mogelijk uw arts, hij zal u een bijkomende behandeling kunnen voorschrijven.

- **Huidverkleuring**
onder de vorm van bruine striemen ter hoogte van de bloedvaten waar het product heeft gelopen.
- **Haarverdunding**
kan optreden bij deze behandeling. Volledig haarverlies is eerder zeldzaam.

Carboplatinum

Carboplatinum is het ander chemotherapeuticum dat u zal krijgen. Carboplatinum is een kleurloos product dat in een infuuszakje van 500 ml opgelost wordt. Het zal u over 60 minuten toegediend worden. U zal dit product enkel de eerste dag van de behandeling toegediend krijgen.

Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, eventueel misselijkheid en braken of verminderde eetlust, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken:

- **Een laag aantal witte bloedcellen**
U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts. **Bij een temperatuur van 38° C of hoger, moet u de arts hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Ook indien u een infectie hebt zonder koorts (bv. verkoudheid, blaasontsteking...) moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen.** U zal een tiental dagen na de behandeling bloed moeten laten prikken bij de huisarts om de weerslag van de therapie op de bloedwaarden te evalueren.
- **Stoornis nierfunctie**
Soms kan er ook een stoornis optreden in de nierfunctie. U kunt hier zelf ook niets voor doen, maar uw arts zal vóór elke nieuwe behandeling uw bloedwaarden hierop controleren. U moet er steeds op letten, thuis geen geneesmiddelen in te nemen die een invloed kunnen hebben op de

nierfunctie. Bespreek daarom steeds een eventuele verandering van de thuismedicatie met uw arts.

- **Vermoeidheid**

De vermoeidheid door deze behandeling is wisselend. Probeer uw activiteiten te plannen en rust voldoende wanneer u zich vermoeid voelt.

Naspoelen

Nadat de medicatie werd toegediend, zal de verpleegkundige nog een laatste infuuszakje met fysiologisch water aanhangen, met de bedoeling, naast het voorkomen van irritatie van uw bloedvaten, u alle medicatie uit de infuusleiding toe te dienen. Op die manier zal u de voorgeschreven dosis volledig gekregen hebben.

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw labwaarden niet goed zijn of als uw nevenwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen. Bij vragen of ongemakken kan u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in deze infogids.