

Chemotherapie Carboplatinum - Pemetrexed (Alimta)

Beste patiënt(e)

Je arts heeft jou deze behandeling voorgesteld, we geven je hier graag meer uitleg.

We wensen je veel succes en moed toe met je behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Carboplatinum-Pemetrexed?

- Beiden zijn verschillende soorten chemo die de celdeling remmen.
- Ze hebben als doel de kankercellen te bestrijden.

Hoe wordt het toegediend?

- Chemo wordt via een infuus in de arm of via PAC toegediend.
- Deze kuur wordt toegediend in het **oncologisch dagziekenhuis**.
- De kuur loopt over **1 dag**.
- 1 week voor de start van de therapie start je met Folavit 0,4 mg 1 keer per dag in pilvorm, en ook met Neurobion I.M. Deze laatste krijg je om de 9 weken toegediend.
- Carboplatinum loopt over **1 uur**.
- Pemetrexed loopt over **10 minuten**.
- Voorafgaand aan de Carboplatinum, en ook nadien dienen we jou extra vocht toe.
- Voor en na de therapie dienen we jou ook een **spoelinfus** toe.
- De eigenlijke therapie dienen we jou via een **chemopomp** toe, zodat de juiste dosis over juiste tijdspanne inloopt.
- **Om de 3 weken** krijg je een kuur.
- De duur hangt af van hoe de kanker reageert en of je niet te veel last hebt van de bijwerkingen.
- Meestal spreekt men van 4 tot 6 kuren in huidige setting, gevolgd door Alimta in monotherapie.
- **! Belangrijk is dat je vooraf je medicatie inneemt:** Medrol (32 mg) de dag voor, dag zelf en de dag na de



therapie, telkens 1 pil van 32 mg bij ontbijt en avondeten.

- Voor de eigenlijke toediening van de chemo krijg je een geneesmiddel om **misselijkheid** te voorkomen: Akynzeo 300 mg.
- Vóór elke toediening van een **nieuw product** vraagt de verpleegkundige naar je naam en geboortedatum.
- De verpleegkundige controleert ook de terugvloeï van **bloed** in je infuusleiding.
- Bij elke manipulatie van de chemo draagt de verpleegkundige **handschoenen** uit veiligheidsoverwegingen.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- Vermoeidheid
- Misselijkheid of braken
- Beperkte mate: lichte haaruitval (start ongeveer 3 weken na toediening)
- Ontsteking van mondslijmvlies (blaasjes in mond, aften)
- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Diarree of verstopping
- Tranende en/of ontstoken ogen
- Smaakverandering

Nabehandeling thuis en praktische info

- Afhankelijk van je **bloedresultaten en algemene toestand**, bestaat de kans dat we jouw behandeling een paar dagen uitstellen of de dosis aanpassen.
- Bij je vertrek uit het ziekenhuis krijg je je volgende **afspraak** mee en ook een overzicht van de nog te nemen **medicatie**.
- Medicatie tegen **misselijkheid** krijg je mee samen met het innameschema. (Litan)
- Ook de tabletten Medrol voor huidige en volgende therapie krijg je mee.
- Normaal wordt er na 2 volledige cycli een **CT Thorax** gepland.
- Vóór elke toediening gebeurt er steeds een **bloedafname** via het ziekenhuis of via huisarts op dag 8 en dag 15.
- Mannelijke patiënten raden we aan **zittend te plassen**.
- Na elke **toiletbeurt** doe je het toiletdeksel dicht en spoel je twee keer door.
- Goede opvolging van je **stoelgangspatroon** is nodig omdat sommige geneesmiddelen verstopping veroorzaken.

- De verpleegkundig consulent begeleidt jou in het verdere verloop van de behandeling.
- De sociaal assistente komt langs bij de opstart van de therapie om info te verschaffen over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz.
- **Goede opvolging van je temperatuur is héél belangrijk!**
Bij een verhoging boven de 38 graden, neem je steeds contact op met je huisarts of het ziekenhuis.
- Nauwkeurige beschrijving en nuttige tips over de bijwerkingen vind je in je infomapje.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid: aarzel niet om ons te contacteren (zie telefoonlijst in je infomapje).