

Cisplatinum - 5FU

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De dienst oncologie

Behandeling

Deze gecombineerde chemotherapie-behandeling met Cisplatinum en 5FU krijgt u om de 4 weken toegediend. U wordt hiervoor gedurende 4 dagen worden opgenomen in het ziekenhuis.

Het aantal van dergelijke cycli die u zal krijgen, is afhankelijk van hoe uw ziekte op deze medicatie reageert.

Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u zal toegediend worden, met hun eventuele mogelijke nevenwerkingen. Alle medicatie wordt in afzonderlijke infuuszakjes klaargemaakt, en via een infuusleiding in een bloedvat ingebracht.

Deze behandeling kan worden gecombineerd met andere behandelingen zoals Cetuximab, een antistof die wekelijks wordt toegediend via een korte dagopname of immunotherapie (cfr aparte brochure).

Een controle met CT-scan is gepland na 2 behandelingen (2 maanden) en na 4 behandelingen.

5FU

Dit product is een van de chemotherapieproducten die u zal worden toegediend. Het product zal u gedurende de verschillende dagen opname worden toegediend. Het wordt opgelost in een baxter van 1 liter die telkens over ongeveer 24 uur zal inlopen.

Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid,



eventueel misselijkheid en braken of verminderde eetlust, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken:

- **diarree**
5-FU kan diarree geven. U mag hiervoor steeds Imodium innemen. Wanneer de diarree uitgesproken is of langer dan 24 uur aanhoudt, dan verwittigt u hiervan best onmiddellijk uw arts.
- **ontsteking mondslijmvlies**
Een goede mondhygiene is aan te raden (meermaals per dag tanden poetsen met een zachte tandenborstel).
- **een laag aantal witte bloedcellen**
U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts, en bij een temperatuur van 38 graden of hoger, moet u onmiddellijk het ziekenhuis contacteren. Ook bij tekens van een infectie (hoesten, branderig gevoel bij het plassen...) moet u onmiddellijk contact opnemen met het ziekenhuis.
Een 10-tal dagen na de chemotherapie laat u bloed prikken bij de huisarts om de weerslag van de behandeling op de bloedwaarden te evalueren.
- **verkleuring huid**
onder de vorm van bruine striemen ter hoogte van de bloedvaten waar het product heeft gelopen.
- **haarverduunning**
kan optreden bij deze behandeling. Volledig haarverlies is eerder zeldzaam.

Cisplatinum

Cisplatinum is het andere chemotherapeuticum dat u zal worden toegediend en dit ook gedurende 3 dagen. Het product is kleurloos en zal afhankelijk van de dosis worden toegediend over 4 uur.

Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, eventueel misselijkheid en braken of verminderde eetlust, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken:

- **laag aantal witte bloedcellen**
U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts, en

bij een temperatuur van 38 graden of hoger, moet u de arts hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Ook bij tekens van een infectie (hoesten, branderig gevoel bij het plassen...) moet u onmiddellijk uw arts te verwittigen.

Een 10-tal dagen na de chemotherapie laat u bloed prikken bij de huisarts om de weerslag van de behandeling op de bloedwaarden te evalueren.

- **schadelijk voor nieren**

Cisplatinum kan schadelijk zijn voor de werking van de nieren. Om die reden krijgt u gedurende deze behandeling veel vocht toegediend via de baxter met als bedoeling de nieren goed te spoelen. U zal dus ook veel moeten plassen tijdens deze behandeling. Ook wordt uw gewicht dagelijks gecontroleerd. Het is uitermate belangrijk dat u geen andere medicatie inneemt die ook een verminderde werking van de nieren kunnen geven (zoals bijvoorbeeld Voltaren enz). Bespreek daarom steeds iedere verandering van uw thuismedicatie met uw arts, ook als het pijnstillers betreft.

- **vermindering gehoor**

Soms kan cisplatinum een vermindering van het gehoor veroorzaken.

- **tintelingen**

Cisplatinum kan ook tintelingen ter hoogte van handen en voeten veroorzaken.

Nabehandeling thuis en praktische info

Indien uw waarden volgens de resultaten van het lab niet goed zijn of indien uw nevenwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.

Bij vragen of ongemakken kan u contact opnemen met het ziekenhuis, zie de telefoonlijst in uw infomapje