Cisplatinum - Etoposide (Vepesid)

Beste patiënt(e)

Je arts heeft jou deze behandeling voorgesteld, we geven je hier graag meer uitleg.

We wensen je veel succes en moed toe met je behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Cisplatinum-Etoposide?

- Beide zijn verschillende soorten chemo die op hun manier de celdeling remmen.
- Ze hebben als doel de kankercellen te bestrijden.

Hoe wordt het toegediend?

- Chemo wordt via een infuus in de arm of via PAC toegediend.
- Deze kuur wordt toegediend op de **verblijfsafdeling**.
- De kuur loopt over **3 dagen.**
- **Cisplatinum** loopt over 4 uur, wordt afgeschermd van het licht en wordt toegediend op de eerste dag.
- **Etoposide** loopt over 1 uur en wordt toegediend op dag 1, 2 en 3.
- Voorafgaand aan de toediening van Cisplatinum en ook nadien dienen we **extra vocht** toe.
- Voor de eigenlijke opstart van chemo krijg je medicatie tegen **misselijkheid**, namelijk Akynzeo en ook Dexamethasone van 12 mg.
- De 2 volgende dagen moet je Dexamethasone 8 mg innemen.
- Beide chemo's worden via een **pomp** toegediend.
- **Om de 3 weken** krijg je een kuur.
- De duur hangt af van hoe de kanker reageert en of je veel last hebt van de bijwerkingen.
- Meestal varieert dit tussen de 4 tot 6 kuren.

azdelta

Deze brochure is laatst aangepast op 16/03/2026 0520 5402-NL

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Vermoeidheid
- Misselijkheid en braken
- Haarverlies (begint na 3-tal weken)
- Koorts van meer dan 38,5 graden (teken van infectie)
- Verminderde eetlust en smaakverandering
- Pijnlijke mond (aften of ontsteking mondslijmvlies)
- Verstopping of diarree
- Tintelingen in handen of voeten
- Verminderde nierfunctie (belang van goed te drinken)

Nabehandeling thuis en praktische info

- In principe mag je alles **eten en drinken**, zelfs een glaasje alcohol mag, maar met mate.
- Blootstelling aan de **zon** raden we af. We raden aan zonneproducten met hoge beschermingsfactor (50+) te gebruiken en een hoofddeksel te dragen.
- Om blootstelling aan chemotherapie te voorkomen bij **seks**, is het belangrijk tot 7 dagen na chemotherapietoediening een voorbehoedsmiddel te gebruiken en is het raadzaam om dit daarna ook verder te gebruiken.
- Bij je **vertrek** uit het ziekenhuis krijgt je je volgende afspraak en een overzicht van de nog te nemen **medicatie**.
- Afhankelijk van je bloedresultaten en je algemene toestand, bestaat de kans dat we jouw behandeling enkele dagen uitstellen of de dosis aanpassen.
- Medicatie tegen **misselijkheid** krijg je mee samen met het innameschema (Litican).
- Normaal wordt er na 2 volledige cycli een **CT Thorax** gepland.
- Vóór elke toediening gebeurt er steeds een **bloedafname** in het ziekenhuis of via huisarts op dag 8 en dag 15.
- Mannelijke patiënten raden we aan **zittend te plassen**.
- Na elke toiletbeurt doe je het toiletdeksel dicht en spoel je twee keer door.
- Goede opvolging van het **stoelgangspatroon** is nodig omdat sommige geneesmiddelen opstoppend werken.

- De verpleegkundig consulent begeleidt jou in het verdere verloop van de behandeling.
- De sociaal assistente komt langs bij de opstart van de therapie om info te verschaffen over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz.
- **Goede opvolging van je temperatuur is héél belangrijk!!**
- Bij een verhoging boven de 38 graden neem je steeds contact op met je huisarts of het ziekenhuis.
- Nauwkeurige beschrijving en nuttige tips over de **bijwerkingen** vind je terug in je infomapje.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid: aarzel niet om ons te contacteren (zie telefoonlijst in je infomapje).