Cisplatinum - Gemcitabine (Gemzar)

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld. Wij geven graag meer uitleg en wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Cisplatinum-Gemcitabine?

Beide producten zijn verschillende soorten chemo die op hun manier de celdeling remmen. Ze hebben allebei als doel om kankercellen te bestrijden.

Hoe wordt de chemo toegediend?

- Via een pomp, met een infuus in de arm of via PAC, PICC.
- De toediening gebeurt op de verblijfsafdeling en loopt over 2 dagen.
- De week nadien wordt er een dag 8 Gemzar gegeven in het oncologisch dagziekenhuis.
- Cisplatinum wordt afgeschermd van het licht, loopt over 4 uur en krijgt u op de 1ste dag. Voorafgaand en ook nadien krijgt u extra vocht om blijvende nierbeschadiging tegen te gaan.
- Gemcitabine loopt over 30 minuten tijdens uw behandeling in de verblijfsafdeling of in het dagziekenhuis.
- Voor de chemo krijgt u medicatie tegen de misselijkheid (Akynzeo en dexamethasone 12).
- De 2 dagen na de chemo neemt u ook Dexamethasone 8 mg in.
- De verpleging draagt bij elke manipulatie van de chemo handschoenen, controleert de terugvloei van bloed in de leiding en vraagt om steeds uw naam en geboortedatum melden.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 12/09/2024 0520 5379-NL

- Om de 3 weken krijgt u een kuur.
- De duur hangt af van hoe de kanker reageert en of u niet te veel last heeft van de bijwerkingen.
- Meestal varieert dit tussen 4 tot 6 kuren.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Vermoeidheid
- Misselijkheid en braken
- Lichte vorm van haarverlies (begint na 3-tal weken)
- Koorts: temperatuur van meer dan 38 graden (wijst op een infectie)
- Verminderde eetlust en smaakverandering
- Pijnlijke mond (aften of ontsteking van het mondslijmvlies)
- Verstopping/diarree
- Tintelingen in handen/voeten (zenuwpijnen)
- Verminderde nierfunctie (belangrijk om goed te drinken: 1,5 liter per dag)

Nabehandeling thuis en praktische info

- In principe mag u alles eten en drinken, ook een glaasje alcohol mag maar met mate.
- Blootstelling aan de zon raden we af, gebruik zonneproducten met hoge beschermingsfactor (50+) en draag een hoofddeksel.
- Normaal plannen we na 2 volledige cycli een CT thorax.
- Om blootstelling aan chemotherapie te voorkomen bij seks, is het belangrijk een voorbehoedsmiddel te gebruiken tot 7 dagen na de toediening van chemo. Ook daarna blijft het gebruik van voorbehoedsmiddelen aangewezen.
- Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u uw volgende afspraak mee en ook een overzicht van de nog te nemen medicatie.
- Afhankelijk van uw bloedresultaten/uw algemene toestand, bestaat de kans dat uw behandeling voor een paar dagen wordt uitgesteld of dat er een aanpassing van de dosis nodig is.
- Medicatie tegen misselijkheid (Litican) krijgt u mee, samen met het innameschema.
- Op dag 8 en dag 15 gebeurt er steeds een bloedafname in het ziekenhuis of via de huisarts.

- Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
- Na elke toiletbeurt doet u het toiletdeksel dicht en spoelt u twee maal door.
- Goede opvolging van het stoelgangpatroon is nodig omdat sommige medicatie opstoppend werkt.
- De verpleegkundig consulent begeleidt u in het verder verloop van de behandeling.
- De sociaal assistente zal bij opstart van uw therapie langskomen om info te geven over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz...
- De diëtiste komt langs bij de opstart en tijdens uw behandelingen, zij geeft tips en voedingsadviezen.
- **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk! Is uw lichaamstemperatuur meer dan 38 graden, neem dan contact op met uw huisarts of met uw arts in het ziekenhuis.**
- Een nauwkeurige beschrijving en nuttige tips over de bijwerkingen vindt u terug in uw infomapje.
- Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, problemen of ongerustheid (zie telefoonlijst in uw infomapje).