

Chemotherapie Cisplatin, paclitaxel (Taxol®) en bevacizumab (Avastin®)

Beste patiënt

Uw arts heeft u volgende therapie voor baarmoederhalskanker voorgesteld. We geven u graag wat meer informatie. We wensen u veel succes en goede moed met uw behandeling.

De dienst oncologie

Behandeling

Deze gecombineerde chemotherapiebehandeling met Cisplatinum, Taxol en Avastin krijgt u om de 3 weken toegediend.

Deze behandeling verloopt via een opname van 1 nacht in het ziekenhuis. De chemo wordt toegediend via een infuus.

Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u zal toegediend worden, met hun eventuele nevenwerkingen.

Cisplatinum

Cisplatinum is kleurloos en wordt toegediend over een tijdspanne van 60 minuten.

Nevenwerkingen

Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, eventueel misselijkheid en braken of verminderde eetlust, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken.

- Een laag aantal witte bloedcellen: u kunt hier zelf niets voor doen. Wel moet u opletten voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts, en bij een temperatuur van 38 graden Celsius of hoger, moet u het ziekenhuis hiervan op de hoogte brengen.
- Cisplatinum kan schadelijk zijn voor de werking van de nieren. Om die reden krijgt u tijdens deze behandeling veel vocht toegediend via uw infuus met als bedoeling de nieren goed te spoelen. U zal dus ook veel moeten plassen tijdens deze behandeling.



Het is belangrijk dat u geen andere medicatie inneemt die ook een verminderde werking van de nieren kunnen geven (zoals bijvoorbeeld Voltaren enz). Bespreek daarom steeds iedere verandering van uw thuismedicatie met uw arts, ook als het pijnstillers betreft.

- Soms kan Cisplatinum een vermindering van het gehoor veroorzaken.
- Cisplatinum kan ook tintelingen ter hoogte van handen en voeten veroorzaken.

Taxol

Taxol is het andere chemoproduct dat u krijgt toegediend. Het product is kleurloos. De toediening neemt 3 uur in beslag. Taxol kan soms allergische reacties veroorzaken. Daarom moet u thuis steeds de avond voor de chemotherapie 1 tablet Dexamethasone innemen, om de mogelijk allergische reactie te voorkomen. Als u deze tablet vergeet, dan kan de behandeling niet doorgaan.

Nevenwerkingen

- Volledige haaruitval
- Laag aantal witte bloedcellen
- Prikkelingen of zinderingen ter hoogte van de vingertoppen en voetzolen. Bij 2 op 3 van de patiënten komt dit voor. Als dit zo is, meld dit dan steeds aan uw arts. Deze klachten verbeteren geleidelijk aan na het stoppen van de behandeling.
- Verspreide spier- en gewrichtspijn
 - Als dit voorkomt, is dit meestal een drietal dagen na de toediening. U mag hiervoor steeds een pijnstiller zoals Dafalgan (paracetamol) innemen.
 - Als dit niet volstaat, neem dan contact op met uw huisarts of specialist voor een sterkere pijnstiller. Deze klachten verdwijnen over het algemeen na enkele dagen. U meldt deze nevenwerking ook best aan uw arts bij de volgende behandeling.
- Vermoeidheid
 - De vermoeidheid door deze behandeling is wisselend. Probeer uw activiteiten te plannen en rust voldoende wanneer u zich vermoeid voelt.

Bevacizumab (Avastin®)

Avastin is op zich geen chemotherapie in de strikte zin van het woord. Het product wordt een angiogenese remmer genoemd. Avastin heeft een invloed op de bloedvatvorming van de tumor. Daardoor wordt de tumor niet meer voorzien van voedingstoffen en zuurstof. Op die manier remt Avastin de groei van de tumor af.

Avastin heeft een aantal specifieke mogelijke **nevenwerkingen**.

- Slechtere wondgenezing.
- Hoge bloeddruk
- Eiwitverlies in de urine
- Verhoogd risico op bloeding of trombose (klontervorming in de bloedvaten)
- Verhoogd risico op perforatie van de tumor. Dit risico is zeer klein.
- Infusiereactie. Zich onwel voelen tijdens inloop van het product. Waarschuw in dit geval onmiddellijk de verpleegkundige van het dagziekenhuis.

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw bloedwaarden niet goed zijn of als uw nevenwerkingen te zwaar zijn kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.

Bij vragen of ongemakken kunt u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in deze infogids.