

Gemcitabine (Gemzar)

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld. Wij geven graag meer uitleg en wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Gemcitabine?

Een product dat de celdeling afremt. Gemcitabine heeft als doel om kankercellen te bestrijden.

Hoe wordt het toegediend?

- Via een pomp met een infuus in de arm of via PAC, PICC.
- De toediening gebeurt in het oncologisch dagziekenhuis.
- Gemcitabine loopt over 30 minuten.
- Voorafgaand aan de Gemcitabine en ook nadien wordt er extra vocht toegediend.
- U krijgt vooraf ook medicatie tegen misselijkheid (Litican).
- De kuur loopt over 3 weken (week 1 en 2 chemo en op week 3 rust).
- De duur hangt af van hoe de kanker reageert en of u niet te veel last hebt van de bijwerkingen.
- Meestal varieert dit tussen 4 tot 6 kuren.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen ?

- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Vermoeidheid
- Misselijkheid en braken

- Lichte vorm van haarverdunding (begint na 3-tal weken)
- Koorts: temperatuur van meer dan 38 graden (wijst op een infectie)
- Verminderde eetlust en smaakverandering
- Pijnlijke mond (aften of ontsteking van het mondslijmvlies)
- Verstopping/diarree
- Tintelingen in handen/voeten (zenuwpijnen)
- Verminderde nierfunctie (belangrijk om goed te drinken: 1,5 liter per dag)

Nabehandeling thuis en praktische info

- In principe mag u alles eten en drinken, ook een glaasje alcohol mag maar met mate.
- Blootstelling aan de zon raden we af, gebruik zonneproducten met hoge beschermingsfactor (50+) en draag een hoofddekseel.
- Om blootstelling aan chemotherapie te voorkomen bij seks, is het belangrijk een voorbehoedsmiddel te gebruiken tot 7 dagen na de toediening van chemo. Ook daarna blijft het gebruik van voorbehoedsmiddelen aangewezen.
- Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u uw volgende afspraak mee en ook een overzicht van de nog te nemen medicatie.
- Afhankelijk van uw bloedresultaten/uw algemene toestand, bestaat de kans dat uw behandeling voor een paar dagen wordt uitgesteld of dat er een aanpassing van de dosis nodig is.
- Medicatie tegen misselijkheid (Litan) krijgt u mee, samen met het innameschema.
- Normaal plannen we na 2 volledige cycli een CT thorax.
- Op dag 8 en dag 15 gebeurt er steeds een bloedafname in het ziekenhuis of via de huisarts.
- Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
- Na elke toiletbeurt doet u het toiletdekseel dicht en spoelt u twee keer door.
- Goede opvolging van het stoelgangspatroon is nodig omdat sommige medicatie opstoppend werkt.
- De verpleegkundig consulent begeleidt u in het verder verloop van de behandeling.
- De diëtiste komt bij u langs voor de opstart en tijdens uw behandelingen, zij geeft tips en voedingsadviezen.

- **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!! Is uw lichaamstemperatuur meer dan 38 graden, neem dan contact op met uw huisarts of uw arts in het ziekenhuis.**
- Een nauwkeurige beschrijving en nuttige tips over de bijwerkingen vindt u terug in uw infomapje.
- Aarzel niet om contact met ons op te nemen bij vragen, problemen of ongerustheid (zie telefoonlijst in uw infomapje).