

Paclitaxel (Taxol®) wekelijks

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg. We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De dienst oncologie

Verloop

Bij deze therapie wordt Taxol wekelijks toegediend in het dagziekenhuis. Afhankelijk van het behandelingsschema wordt er soms een rustweek ingepland.

Deze behandeling bestaande uit een bloedafname, een raadpleging bij uw behandelende arts en de toediening van de medicatie, zal ongeveer een halve dag duren.

Hierna krijgt u in volgorde een overzicht van de medicatie die u zal krijgen, met hun eventuele mogelijke nevenwerkingen. Alle medicatie wordt in afzonderlijke infuuszakjes klaargemaakt en via een infuusleiding in een bloedvat ingebracht.

Litican

Dit is een medicijn dat wordt gebruikt tegen de misselijkheid.

U krijgt van de verpleegkundige een aantal tabletten Litican mee om thuis in te nemen bij misselijkheid. U mag zonder probleem tot 6 tabletten per dag innemen en dit zolang dit nodig is.

Taxol

Taxol is het chemotherapieproduct dat u zal worden toegediend. Het product is kleurloos en het wordt toegediend via uw infuus gedurende 1 uur.



Taxol kan allergische reacties veroorzaken.

Hiervoor moet u (voor de eerste 2 toedieningen) thuis de avond voor de chemotherapie 1 tablet Dexamethasone innemen, precies om allergische reactie te voorkomen.

Nevenwerkingen

Naast de klassieke nevenwerkingen zoals moeheid, eventueel misselijkheid en braken of verminderde eetlust, kan dit product verantwoordelijk zijn voor een aantal andere ongemakken nl.

- **volledige haaruitval** (kan worden voorkomen met hoofdhuidkoeling)
- **een laag aantal witte bloedcellen**

U kunt hier zelf niets voor doen. Wel moeten we u aanraden op te letten voor mogelijke infecties. Controleer daarom dagelijks uw koorts, en bij een temperatuur van 38°C of hoger, moet u onmiddellijk het ziekenhuis op de hoogte brengen. Ook wanneer u een infectie hebt (met of zonder koorts) zoals een verkoudheid, blaasontsteking.. moet u altijd zo snel mogelijk uw arts of verpleegkundig consulent, die u begeleidt tijdens de behandeling, raadplegen.

- **prikkelingen en zinderingen**

Bij 2 op 3 van de patiënten komen soms prikkelingen of zinderingen ter hoogte van de vingertoppen en voetzolen voor. Als dit zo is, meld dit steeds aan uw arts of verpleegkundig consulent. Meestal verbeteren deze klachten na het stoppen van de behandeling.

- **spier- en gewrichtspijn**

Taxol kan bij een aantal patiënten verspreide spier-en gewrichtspijn veroorzaken en dit meestal enkele dagen na de toediening. Hiervoor kan u Dafalgan (paracetamol) innemen. Als dit niet volstaat, neem dan contact op met uw huisarts of specialist voor een sterkere pijnstiller. Deze klachten verdwijnen over het algemeen na enkele dagen. U meldt deze nevenwerking ook best aan uw arts bij de volgende behandeling.

- **vermoeidheid.**

Nabehandeling thuis en praktische info

Als uw waarden, de resultaten van het onderzoek in het lab niet goed zijn of als de nevenwerkingen te zwaar zijn, kan uw arts beslissen de behandeling uit te stellen of definitief te stoppen.

Bij vragen of ongemakken kan u contact opnemen met het ziekenhuis, zie telefoonlijst in uw infomapje.