Chemotherapie Paclitaxel-Taxol (wekelijks)

Beste patiënt

Je arts heeft volgende behandeling voorgesteld. We geven je in deze brochure graag wat meer uitleg hierover.
We wensen je veel succes en moed toe met je behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Taxol?

- Het bevat het celremmend geneesmiddel Paclitaxel.
- Voor patiënten met een uitgezaaide longkanker.

Hoe werkt Taxol ?

- Taxanen zoals paclitaxel verstoren de celstructuur waardoor celdeling niet meer goed plaatsvindt. Dit doet het medicijn door de aanmaak van 'microtubuli' te verstoren.
- In elke cel bevinden zich deze microtubuli, dit zijn kleine buisvormige structuren in de cel.
- Die buisjes maken deel uit van het 'geraamte' van de cel en zijn belangrijk bij de celdeling.
- Paclitaxel verstoort de aanmaak van deze microtubili door enerzijds de aanmaak ervan aan te wakkeren, en anderzijds te verhinderen dat bestaande microtubili worden afgebroken.
- Hierdoor verstikt de cel als het ware in de aangemaakte microtubuli en kan hij zich niet meer delen.

Waar en hoe wordt Taxol toegediend?

- De therapie dienen we in het oncologisch dagziekenhuis toe.
- Je moet niet nuchter binnenkomen tenzij anders werd gevraagd.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 08/12/2025 0520 6048-NL

- Je krijgt gedurende 2 opeenvolgende weken therapie en dan 1 week rust, om daarna opnieuw hetzelfde te herhalen.
- Meestal zijn het 4 tot 6 cycli (dit is afhankelijk van het resultaat, maar ook van hoe goed je de behandeling verdraagt).
- Het product wordt via een infuus toegediend langs een ader of via een poortkatheter.
- Belangrijk is dat je **vooraf je medicatie hebt ingenomen**: 1 pil Dexamethasone 8 mg daags voordien bij het avondeten!!!
- Voor de eigenlijke toediening van de chemo krijg je een geneesmiddel om misselijkheid te voorkomen: Litican 2 pillen.
- Voor en na de therapie dienen we een spoelinfuus toe.
- De eigenlijke therapie dienen we via een chemopomp toe (= zodat juiste dosis over juiste tijdspanne inloopt).
- Taxol loopt in over een half uur.
- Vóór elke toediening van een nieuw product vraagt de verpleegkundige je naam en geboortedatum.
- De verpleegkundige controleert ook terugvloei van bloed van je infuusleiding.
- Bij elke manipulatie van de chemo draagt de verpleegkundige handschoenen omwille van de veiligheid.
- Bij deze kuur heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van de ijskapkoeling om haarverlies te beperken.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen ?

- Vermoeidheid.
- Misselijkheid of braken.
- Volledige haaruitval (= start ongeveer 3 weken na toediening). Dit is beperkt of leidt zelfs niet tot haaruitval bij ijskapkoeling.
- Ontsteking van mondslijmvlies (= blaasjes in mond, aften).
- Invloed op de bloedcellen (= rode, witte en bloedplaatjes).
- Diarree of obstipatie.
- Tintelingen ter hoogte van handen en voeten.
- Overgevoeligheidsreacties tijdens inlopen van het product; beklemmend gevoel op de borst, grieperigheid, jeuk, ademnood.

Nabehandeling thuis en praktische info.

- Afhankelijk van je bloedresultaten en je algemene toestand, bestaat de kans dat je behandeling voor een paar dagen wordt **uitgesteld**, of dat er een aanpassing van de dosis noodzakelijk is.
- Bij je vertrek uit het ziekenhuis, krijg je een **afspraak** mee voor een volgende raadpleging en ook een overzicht van de nog te nemen **medicatie**. 1 pil Dexamethasone 8 mg krijg je mee als voorbereiding voor de volgende kuur.
- **Medicatie tegen misselijkheid** krijg je ook mee samen met het innameschema (Litican).
- Aanvragen voor de **geplande onderzoeken** voor volgende keer geven we je ook mee bij je vertrek uit het ziekenhuis.
- Gewoonlijk plannen we na 2 volledige cycli een **CT Thorax** (na 8 weken).
- Vóór elke toediening is er steeds een **bloedafname** gepland in het ziekenhuis of via je huisarts
- We raden mannelijke patiënten aan altijd **zittend te plassen**.
- Na elke **toiletbeurt** moet je het toiletdeksel sluiten en twee keer spoelen.
- Een goede opvolging van het **stoelgangpatroon** is nodig omdat sommige geneesmiddelen opstoppend werken.
- De v**erpleegkundig consulent** begeleidt jou in het hele verloop van de behandeling.
- De **sociaal assistente** komt bij jou langs bij de opstart van de therapie om info te verschaffen over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz.
- Ook de **diëtiste** krijg je bij elke opname te zien om te polsen of op vlak van voeding alles vlot verloopt of er eventueel bijsturing of opvolging nodig is.
- **Goede opvolging van je temperatuur is héél belangrijk!!** Bij een verhoging boven de 38 graden moet je altijd je huisarts contacteren!
- Nauwkeurige beschrijving en nuttige tips in kader van de **bijwerkingen** kan je vinden in de informatiegids.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid: aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in de informatiegids).