Pemetrexed mono (Alimta)

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Pemetrexed mono?

- Is een soort chemo die op zijn manier de celdeling remt.
- En heeft als doel de kankercellen te bestrijden.

Hoe wordt het toegediend?

- Chemo wordt via een infuus in de arm of via PAC toegediend.
- Deze kuur wordt toegediend op het oncologisch dagziekenhuis
- De kuur loopt over halve dag.
- 1 week voor start therapie wordt Folavit 0,4 mg opgestart, 1 maal per dag alsook Neurobion I.M. ; deze laatste moet steeds om de 9 weken herplaatst worden
- Pemetrexed loopt over 10 minuten .
- De chemo wordt via een pomp toegediend.
- Om de 3 weken krijgt u een kuur.
- De duur hangt af van hoe de kanker reageert, en of u te veel last hebt van de bijwerkingen.
- Het product wordt via een infuus toegediend langs een ader of via eenpoortcatheter.
- **Belangrijk is dat u vooraf uw medicatie hebt ingenomen (1 coMedrol 32 mg daags voordien bij het ontbijt en avondmaal en ook vóór start van de therapie!!**
- Vooraf en achter de therapie wordt er een spoelinfuus toegediend.
- De eigenlijke therapie wordt via een chemopomp toegediend (zodat juiste dosis over juiste tijdspanne inloopt)
- Vóór elke toediening van een nieuw product vraagt de de

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 27/08/2020 0520 5386-NL

verpleegkundige naar uw naam en geboortedatum
• De verpleegkundige controleert ook de terugvloei van bloed in uw infuusleiding.
• Bij elke manipulatie van de chemo draagt de verpleegkundige handschoenen om veiligheidsoverwegingen.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

• Vermoeidheid
• Misselijkheid / braken
• Beperkte mate haaruitval (= start ongeveer 3 weken na toediening)
• Ontsteking van mondslijmvlies (blaasjes in mond, aften)
• Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
• Diarree / obstipatie
• Tranende en geïrriteerde ogen
• Smaakverandering

Nabehandeling thuis en praktische info.

• Afhankelijk van uw bloedresultaten / uw algemene toestand, bestaat de kans dat uw behandeling voor paar dagen wordt uitgesteld of dat de dosis wordt aangepast.
• Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u uw volgende afspraak mee en ook een overzicht van de nog te nemen medicatie. (1 co Medrol 32 mg voor vanavond en 2 comprimés nog voor morgenvroeg en morgenavond en 3 comprimés als voorbereiding voor de volgende kuur.)
• Medicatie tegen misselijkheid krijgt u mee samen met het innameschema.(Litican)
• Aanvragen voor de geplande onderzoeken voor volgende maal krijgt u ook mee bij uw vertrek uit het ziekenhuis.
• Normaal wordt na 2 volledige cycli een CT Thorax gepland, bij stabiliteit gebeurt dit telkens na 3 cycli.
• Vóór elke toediening gebeurt er steeds een bloedafname in het ziekenhuis.
• Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
• Na elke toiletbeurt doet u het toiletdeksel dicht en spoelt u twee keer door.
• Goede opvolging van het stoelgangspatroon is nodig omdat sommige geneesmiddelen opstoppend werken.

• De verpleegkundig consulent begeleidt u bij het verder verloop van de behandeling.
• De sociaal assistente komt bij de opstart van de therapie langs om info te verschaffen over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz...
• **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!**
• Bij een verhoging boven de 38 graden neemt u steeds op met uw huisarts of het ziekenhuis.
• Nauwkeurige beschrijving en nuttige tips in kader van de bijwerkingen zijn terug te vinden in uw infomapje.
• Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in uw infomapje)