

Pemetrexed mono (Alimta)

Beste patiënt(e)

Uw arts heeft u deze behandeling voorgesteld, we geven u hier graag meer uitleg.

We wensen u veel succes en moed toe met uw behandeling.

De diensten oncologie en hematologie

Wat is Pemetrexed mono?

- Is een soort chemo die op zijn manier de celdeling remt.
- En heeft als doel de kankercellen te bestrijden.

Hoe wordt het toegediend?

- Chemo wordt via een infuus in de arm of via PAC toegediend.
- Deze kuur wordt toegediend op het oncologisch dagziekenhuis
- De kuur loopt over halve dag.
 - 1 week voor start therapie wordt Folavit 0,4 mg opgestart, 1 maal per dag alsook Neurobion I.M. ; deze laatste moet steeds om de 9 weken herplaatst worden
- Pemetrexed loopt over 10 minuten .
- De chemo wordt via een pomp toegediend.
- Om de 3 weken krijgt u een kuur.
- De duur hangt af van hoe de kanker reageert, en of u te veel last hebt van de bijwerkingen.
 - Het product wordt via een infuus toegediend langs een ader of via eenpoortcatheter.
- **Belangrijk is dat u vooraf uw medicatie hebt ingenomen (1 coMedrol 32 mg daags voordien bij het ontbijt en avondmaal en ook vóór start van de therapie!!**
 - Vooraf en achter de therapie wordt er een spoelinfuus toegediend.
 - De eigenlijke therapie wordt via een chemopomp toegediend (zodat juiste dosis over juiste tijdsperiode inloopt)
 - Vóór elke toediening van een nieuw product vraagt de de



verpleegkundige naar uw naam en geboortedatum

- De verpleegkundige controleert ook de terugvloeï van bloed in uw infuusleiding.
- Bij elke manipulatie van de chemo draagt de verpleegkundige handschoenen om veiligheidsoverwegingen.

Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?

- Vermoeidheid
- Misselijkheid / braken
- Beperkte mate haaruitval (= start ongeveer 3 weken na toediening)
- Ontsteking van mondslijmvlies (blaasjes in mond, aften)
- Invloed op de bloedcellen (rode, witte en bloedplaatjes)
- Diarree / obstipatie
- Tranende en geïrriteerde ogen
- Smaakverandering

Nabehandeling thuis en praktische info.

- Afhankelijk van uw bloedresultaten / uw algemene toestand, bestaat de kans dat uw behandeling voor paar dagen wordt uitgesteld of dat de dosis wordt aangepast.
- Bij uw vertrek uit het ziekenhuis krijgt u uw volgende afspraak mee en ook een overzicht van de nog te nemen medicatie. (1 co Medrol 32 mg voor vanavond en 2 comprimés nog voor morgenvroeg en morgenavond en 3 comprimés als voorbereiding voor de volgende kuur.)
- Medicatie tegen misselijkheid krijgt u mee samen met het innameschema. (Litan)
- Aanvragen voor de geplande onderzoeken voor volgende maal krijgt u ook mee bij uw vertrek uit het ziekenhuis.
- Normaal wordt na 2 volledige cycli een CT Thorax gepland, bij stabiliteit gebeurt dit telkens na 3 cycli.
- Vóór elke toediening gebeurt er steeds een bloedafname in het ziekenhuis.
- Mannelijke patiënten raden we aan zittend te plassen.
- Na elke toiletbeurt doet u het toiletdeksel dicht en spoelt u twee keer door.
- Goede opvolging van het stoelgangspatroon is nodig omdat sommige geneesmiddelen opstoppend werken.

- De verpleegkundig consulent begeleidt u bij het verder verloop van de behandeling.
- De sociaal assistente komt bij de opstart van de therapie langs om info te verschaffen over mogelijke tegemoetkomingen, reiskosten, sociale voorzieningen, enz...
- **Goede opvolging van uw temperatuur is héél belangrijk!!**
- Bij een verhoging boven de 38 graden neemt u steeds op met uw huisarts of het ziekenhuis.
- Nauwkeurige beschrijving en nuttige tips in kader van de bijwerkingen zijn terug te vinden in uw infomapje.
- Bij vragen, problemen of ongerustheid aarzel niet om contact met ons op te nemen (zie telefoonlijst in uw infomapje)