

Chemotherapie Vargatef 100mg (= Nintedanib)

Wat is Vargatef ?

- Medicijn aangewezen bij mensen met een longadenocarcinoom
- Voor patiënten die voorheen al andere therapie hebben gekregen, en waarbij tumor is weer gaan groeien.

Hoe werkt Vargatef ?

- Blokkeert de activiteit van een groep eiwitten die betrokken zijn bij ontwikkeling van bloedvaten, die de kankercel nodig heeft om zich te voeden.
- Vargatef blokkeert de werking van het eiwit en vertraagt zo de groei en verspreiding van kankercellen.

Hoe wordt Vargatef ingenomen ?

- Het wordt toegediend in combinatie met chemotherapie (Taxotère)
- Dosis volgens het voorschrift van de arts.
- **Mogen niet ingenomen worden op de dag van uw chemotherapie!!!**
- Zachte capsule met een dosis van 100 mg.
- Aanbevolen dosis is 200 mg (= 2 capsules van 100 mg).
- 2 maal per dag en liefst op hetzelfde tijdstip ('s ochtends en 's avonds met 12 uur ertussen).
- De capsules moeten bij de maaltijd ingenomen worden met groot glas water.
- Capsules in zijn geheel innemen, **niet** op bijten of pletten.
- Bij braken na doorslikken dosis, geen extra dosis innemen maar wachten tot volgend tijdstip van inname.
- **Slik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen!!**

Wisselwerking met andere geneesmiddelen?

- Het is aangeraden om bij start van elk nieuw medicijn de arts hiervan op de hoogte te stellen, zo kan de arts nagaan of er een wisselwerking zou kunnen optreden.



- Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Vargatef verminderen of de kans op bijwerkingen verhogen.
- Eet geen pompoemes, drink **géén pompoemoessap** of gebruik **geen preparaten op basis van sint-janskruid**.

Mogelijke bijwerkingen

- Vermoeidheid
- Misselijkheid / braken/verminderde eetlust
- Huiduitslag (gevoeligheid aan zon en UV-licht)
- Verhoogd risico op infecties
- Diarree
- Invloed op bloedcellen
- Gestoorde leverwaarden

Nabehandeling thuis en praktische info

- Bewaar medicatie op veilige plaats, buiten bereik van kinderen en op kamertemperatuur.
- Na 3 weken is er een raadpleging, met bloedafname vooraf gepland om na te gaan of u niet te veel hinder hebt van de medicatie.
- Na 6 weken is er een CT gepland en een bloedafname om na te gaan of de therapie aanslaat.
- Als de chemokuur wordt gestopt na 4 of 6 toedieningen zal u Vargatef blijven doornemen aan de voorgeschreven dosis.
- 1 verpakking is goed voor een therapie van 4 weken.
- U kunt enkel de medicatie verkrijgen in de ziekenhuisapotheek, dus na elke raadpleging krijgt u een voorschrift mee om de medicatie te kunnen afhalen in de ziekenhuisapotheek.
- Orale anticonceptie verliest zijn werkzaamheid bij de inname van Vargatef, dus gebruik er een ander betrouwbaar voorbehoedsmiddel bij.
- Neem het geneesmiddel precies in zoals uw arts dat heeft uitgelegd.
- Ook hoelang u het middel inneemt, is afhankelijk van de effecten van de behandeling.
- Belangrijk is ook de medicatie niet aan te raken met uw handen, duw ze uit in een potje en neem ze dan in.
- Bij misselijkheid mag u hiervoor gerust medicatie nemen (Litan, Motilium of Primperan telkens 20 minuten voor elke maaltijd).
- Mannen raden we aan steeds zittend te plassen.

- **Bij koorts van meer dan 38 graden moet u de huisarts , behandelende arts of verpleegkundig consulent verwittigen.**
- Als er andere bijwerkingen of problemen zijn, noteer ze en stel ze gerust aan uw arts bij de volgende afspraak.
- Bij ongerustheid of onzekerheid aarzel niet om ons vroegtijdig te contacteren (telefoonlijst zie infomapje).