Chemotherapie Vargatef 100mg (= Nintedanib)

Wat is Vargatef ?

- Medicijn aangewezen bij mensen met een longadenocarcinoom
- Voor patiënten die voorheen al andere therapie hebben gekregen, en waarbij tumor is weer gaan groeien.

Hoe werkt Vargatef ?

- Blokkeert de activiteit van een groep eiwitten die betrokken zijn bij ontwikkeling van bloedvaten, die de kankercel nodig heeft om zich te voeden.
- Vargatef blokkeert de werking van het eiwit en vertraagt zo de groei en verspreiding van kankercellen.

Hoe wordt Vargatef ingenomen ?

- Het wordt toegediend in combinatie met chemotherapie (Taxotère)
- Dosis volgens het voorschrift van de arts.
- **Mogen niet ingenomen worden op de dag van uw chemotherapie!!!**
- Zachte capsule met een dosis van 100 mg.
- Aanbevolen dosis is 200 mg (= 2 capsules van 100 mg).
- 2 maal per dag en liefst op hetzelfde tijdstip (‘s ochtends en ‘s avonds met 12 uur ertussen).
- De capsules moeten bij de maaltijd ingenomen worden met groot glas water.
- Capsules in zijn geheel innemen, **niet** op bijten of pletten.
- Bij braken na doorslikken dosis, geen extra dosis innemen maar wachten tot volgend tijdstip van inname.
- **Slik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen!!**

Wisselwerking met andere geneesmiddelen?

- Het is aangeraden om bij start van elk nieuw medicijn de arts hiervan op de hoogte te stellen, zo kan de arts nagaan of er een wisselwerking zou kunnen optreden.

azdelta
Uw ziekenhuis.

Deze brochure is laatst aangepast op 15/11/2023 0520 6396-NL

- Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Vargatef verminderen of de kans op bijwerkingen verhogen.
- Eet geen pompelmoes, drink **géén pompelmoessap** of gebruik **geen preparaten op basis van sint-janskruid.**

Mogelijke bijwerkingen

- Vermoeidheid
- Misselijkheid / braken/verminderde eetlust
- Huiduitslag (gevoeligheid aan zon en UV-licht)
- Verhoogd risico op infecties
- Diarree
- Invloed op bloedcellen
- Gestoorde leverwaarden

Nabehandeling thuis en praktische info

- Bewaar medicatie op veilige plaats, buiten bereik van kinderen en op kamertemperatuur.
- Na 3 weken is er een raadpleging, met bloedafname vooraf gepland om na te gaan of u niet te veel hinder hebt van de medicatie.
- Na 6 weken is er een CT gepland en een bloedafname om na te gaan of de therapie aanslaat.
- Als de chemokuur wordt gestopt na 4 of 6 toedieningen zal u Vargatef blijven doornemen aan de voorgeschreven dosis.
- 1 verpakking is goed voor een therapie van 4 weken.
- U kunt enkel de medicatie verkrijgen in de ziekenhuisapotheek, dus na elke raadpleging krijgt u een voorschrift mee om de medicatie te kunnen afhalen in de ziekenhuisapotheek.
- Orale anticonceptie verliest zijn werkzaamheid bij de inname van Vargatef, dus gebruik er een ander betrouwbaar voorbehoedsmiddel bij.
- Neem het geneesmiddel precies in zoals uw arts dat heeft uitgelegd.
- Ook hoelang u het middel inneemt, is afhankelijk van de effecten van de behandeling.
- Belangrijk is ook de medicatie niet aan te raken met uw handen, duw ze uit in een potje en neem ze dan in.
- Bij misselijkheid mag u hiervoor gerust medicatie nemen (Litican, Motilium of Primperan telkens 20 minuten voor elke maaltijd).
- Mannen raden we aan steeds zittend te plassen.

- **Bij koorts van meer dan 38 graden moet u de huisarts , behandelende arts of verpleegkundig consulent verwittigen.**
- Als er andere bijwerkingen of problemen zijn, noteer ze en stel ze gerust aan uw arts bij de volgende afspraak.
- Bij ongerustheid of onzekerheid aarzel niet om ons vroegtijdig te contacteren (telefoonlijst zie infomapje).